

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes
Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PROFESSIONNELS DE SANTÉ** »

Erlotinib TARCEVA®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- L'erlotinib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique humain de type 1 (EGFR).
- Indications 2017 :
 - ✓ Cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) localement avancé ou métastatique à EGFR muté :
 - En 1^{ère} ligne de traitement et après échec d'au moins une ligne de traitement
 - En monothérapie de maintenance en cas de maladie stable après une 1^{ère} ligne de chimiothérapie (*Indication non remboursée*)
 - ✓ Cancer du pancréas métastatique en association à la gemcitabine (*indication non remboursée*).
- Posologie usuelle :
 - CBNPC : 150 mg en une prise par jour.
 - Cancer du pancréas : 100 mg en une prise par jour.
- Dosages disponibles : Comprimés à 25 mg, 100 mg et 150 mg.
- Modalités de prise : L'erlotinib doit être avalé entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau, au moins 1h avant ou 2h après un repas, de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie.
 - Dispensation exclusivement dans les pharmacies de ville.

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les comprimés.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante sans augmenter la dose. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Notez l'incident.



Alertes

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP 3A4](#)

Le tabac diminue les concentrations plasmatiques. Inciter les fumeurs à arrêter de fumer.

Gestion des principaux effets indésirables

Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Eruption cutanée, acné, démangeaisons, assèchement Prédicatif de l'efficacité (avant 4-8 semaines)	Eviter l'exposition au soleil et utilisation d'une protection solaire adaptée. Utiliser un savon doux et une crème émolliente. Possibilité d'une prévention des surinfections par antibiothérapie Diminution sévérité toxicité cutanée par administration doxycycline.	Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement. Démangeaisons peuvent être traitées par antihistaminique oral et/ou dermocorticoïdes.
Paronychies		
Diarrhée	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques
Nausées / vomissements	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.
Dyspnée, toux	Bilan pulmonaire Surveillance renforcée en cas d'infections respiratoires, irradiation, chimiothérapie.	En cas de majoration rechercher pneumopathie interstitielle et contacter le médecin prescripteur.
Moins fréquents		
Toxicité neurologique : fatigue, céphalées	-Conserver une activité physique modérée (marche 30 min) est recommandée.	Prudence en cas de conduite de véhicule.

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament