

Recommandations générales

● GROSSESSE - ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

VOTRIENT est susceptible de perturber vos bilans hépatique et thyroïdien. Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement.

● AUTRES REMARQUES

Vos fonctions cardiaques étant susceptibles d'être perturbées, un bilan sera effectué à l'instauration du traitement, et sera suivi par des contrôles réguliers par la suite. Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous oubliez une prise, ne doublez pas la dose suivante. Poursuivez le traitement normalement et informez-en votre médecin.

Protocole VOTRIENT

Vous allez suivre un traitement par thérapie ciblée selon le protocole VOTRIENT® (Pazopanib).

Ce médicament sera pris par voie orale
une fois par jour en une prise,
de préférence à la même heure chaque jour.

Les comprimés doivent être pris
au moins 1h avant ou 2h après un repas.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **VOTRIENT**

| FRÉQUENCE | PRÉVENTION | QUE FAIRE ? |
|--|---|---|
| <p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hypertension artérielle, maux de tête, bourdonnements d'oreilles, vertiges. • Diarrhées. • Nausées, vomissements. • Troubles du goût. • Perte d'appétit. • Fatigue. | <ul style="list-style-type: none"> • Suivre votre tension à domicile à l'aide d'un tensiomètre. Faire de l'exercice, contrôler votre poids. Limiter la consommation de sel et d'alcool. • Un bilan cardiaque sera effectué à l'instauration du traitement, et un suivi régulier sera assuré par l'équipe soignante. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. • Prendre plusieurs petites collations dans la journée, manger lentement, et boire beaucoup. • Maintenir une activité physique (marche-bicyclette), faire des exercices de relaxation et des siestes de courte durée. | <ul style="list-style-type: none"> • Consulter votre médecin si ces signes surviennent. Si besoin, il pourra prescrire un médicament antihypertenseur. • Boire beaucoup d'eau. Suivre de façon stricte la prescription médicale antidiarrhéique. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Prévenir le médecin si ces signes surviennent. • En parler à votre médecin. Une diététicienne pourra vous accompagner. • En parler à votre médecin. |
| <p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crampes, douleurs musculaires. • Troubles cutanés, sécheresse, dépigmentation. • Inflammation buccale, ulcérations. | <ul style="list-style-type: none"> • Boire régulièrement dans la journée, éviter les efforts physiques trop importants et les mouvements répétitifs. • Eviter de rester trop longtemps debout, de porter des chaussures serrées. Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac. | <ul style="list-style-type: none"> • En parler à votre médecin. • En parler au médecin ou à l'infirmière. • Prévenir le médecin qui pourra prescrire des bains de bouche adaptés ou un traitement par voie orale. |

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.