

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée. Les hommes traités par Revlimid® doivent utiliser un contraceptif.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anticancéreux :

- Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter: le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Protégez-vous des rayons du soleil: évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

- Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies: solutions d'hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux. Des prescriptions prévisionnelles sont souvent prévues pour les complications les plus prévisibles et en cas de symptômes bien identifiables.
- Votre médecin et votre pharmacien vont vous informer sur le bon usage et sur les risques liés à vos traitements anticancéreux et associés. Informez-les de tous les traitements (y compris les médicaments délivrés sans ordonnance comme l'aspirine et le paracétamol, les compléments alimentaires et les plantes) que vous prenez régulièrement ou temporairement car certains peuvent interagir avec les médicaments du cancer.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin traitant devant tout nouveau symptôme ou anomalie (sauf indication d'appel direct précisé par l'équipe hospitalière référente).
- Indiquez-lui tout événement médical intercurrent et si vous souffrez de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, de troubles neurologiques.

Protocole REVLIMID Dexaméthasone

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole REVLIMID-Dexaméthasone.

Ce protocole comprend l'administration de 2 médicaments :
REVLIMID® Lénalidomide
Dexaméthasone

Le REVLIMID® est administré par voie orale tous les jours pendant 21 jours consécutifs suivi d'une semaine d'arrêt.

La Dexaméthasone est administrée par voie orale, et par séquence de quelques jours ou en prise unique hebdomadaire.

Le REVLIMID® et la Dexaméthasone ne sont disponibles qu'en pharmacie hospitalière. Votre médecin vous remettra un accord de soins et un carnet de suivi patient vous donnant toutes les informations sur le REVLIMID®.

- Ne pas écraser, ni mâcher ou sucer les comprimés.
- Ne pas manipuler ou faire manipuler les comprimés à mains nues.
 - Tenir les comprimés éloignés des enfants.
- Prendre les comprimés à jeun avec un grand verre d'eau et garder une hydratation suffisante d'au moins 2 litres par jour.



Ce document d'information, destiné au patient et à son entourage, vient compléter l'information donnée oralement par l'équipe soignante et aide le patient à mieux connaître les effets indésirables générés par les traitements anticancéreux.

Il a été élaboré par un **groupe pluridisciplinaire du réseau régional de cancérologie d'Ile de France, ONCORIF** dans le cadre d'un partenariat avec le **réseau régional de cancérologie d'Auvergne ONCAUVERGNE**.

Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES EVENTUELS ?

Protocole **REVLIMID-Dexaméthasone**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none">• Une modification sensible mais transitoire de la numération formule sanguine peut être observée :<ul style="list-style-type: none">- leucopénie (baisse des globules blancs) et neutropénie (baisse de certains globules blancs : neutrophiles),- thrombopénie (baisse des plaquettes),- anémie (baisse des globules rouges).• Signes d'infection liés à la diminution du nombre de globules blancs dans le sang : fièvre, frissons, toux et maux de gorge. <p>Certaines infections peuvent également être observées : pneumonie, herpès, zona. Ce risque d'infection peut être prolongé plusieurs mois après la fin du traitement.</p> <ul style="list-style-type: none">• La Dexaméthasone est un corticoïde et peut entraîner l'apparition d'un diabète (taux de sucre excessif dans le sang), l'apparition de rétention d'eau et de sel (œdèmes des chevilles) et une excitation inhabituelle.• Phlébite veineuse et embolie pulmonaire.• Constipation pouvant rarement aller jusqu'à l'occlusion (suppression des matières et des gaz).• Diarrhées survenant en moyenne 4 ou 8 jours après le cycle.• Fatigue.	<ul style="list-style-type: none">• Une surveillance régulière de la numération formule sanguine (NFS) vous sera prescrite.• Limiter les contacts avec les personnes malades. Se laver souvent les mains. Un traitement préventif de certaines infections (Bactrim®, Zelitrex®) pourra vous être prescrit. L'arrêt se fera plusieurs mois après la fin de la chimiothérapie.• Régime alimentaire pauvre en sel (éviter conserves, plats cuisinés industriels, charcuterie). Diminuer la consommation de sucres rapides et de graisses animales ; favoriser fruits et légumes (notamment les bananes riches en potassium). Une supplémentation potassique pourra être proposée. Prendre la Dexaméthasone le matin.• Port de bas de contention surtout si vous restez de longs moments alité. Préserver une activité physique régulière. Il est possible que votre médecin vous prescrive des anticoagulants à dose préventive pour vous protéger de cet effet secondaire.• Boire en quantité suffisante. Pratiquer un exercice physique régulier et adapté, manger des aliments contenant des fibres.• Alimentation riche en féculents, riz et pâtes.• Maintenir une activité physique (marche, bicyclette), faire des exercices de relaxation, et des siestes de courte durée.	<ul style="list-style-type: none">• Un traitement préventif et curatif, correcteur de certains éléments de la formule sanguine (G-CSF, EPO) pourra être prescrit ou encore une transfusion de plaquettes ou de globules rouges pourra être envisagée.• Contrôler sa température et prévenir immédiatement votre médecin si elle est supérieure à 38 °C. Un bilan sanguin et éventuellement une prescription d'antibiotiques seront effectués. Une hospitalisation pourra être nécessaire. Compte-tenu d'un risque d'infection virale prolongé plusieurs mois après la fin du traitement, une surveillance est nécessaire.• Si vous avez anormalement soif, si vous urinez plus que d'habitude et prenez du poids, prévenir votre médecin. En cas de troubles du sommeil marqués, en particulier avec retentissement sur l'activité diurne, un traitement par sédatif voire par somnifère pourra être proposé.• Prévenir votre médecin rapidement si vous avez une douleur, un gonflement de la jambe, ou si vous constatez l'apparition d'un essoufflement ou d'une douleur dans la poitrine. Un traitement anticoagulant à dose curative est nécessaire si le diagnostic est confirmé.• Prise de laxatifs, lavement, prévenir l'équipe soignante en cas de constipation persistante et/ou de douleur abdominale.• Penser à bien boire. Si la diarrhée persiste, prévenir votre médecin.• A signaler à votre médecin.
<p>ATTENTION Risque de malformation congénitale.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Une contraception efficace est indispensable pendant toute la durée du traitement aussi bien chez les femmes traitées que chez les partenaires féminines des patients traités. Le port du préservatif est indispensable chez les patients traités dont la partenaire est en âge de procréer. L'absence de grossesse sera vérifiée tous les mois (si nécessaire).	<ul style="list-style-type: none">• En cas de survenue de grossesse sous traitement, celui-ci devra être arrêté et vous serez adressé à un spécialiste pour évaluation et conseil.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun. Les connaître et les signaler permet de les anticiper ou de les traiter de façon mieux adaptée.