

Table des matières

Contenu

I.	Définition.....	3
II.	Objectif.....	3
III.	Condition	3
IV.	Préparations	3
V.	Déroulement - Durée.....	3
VI.	Surveillance.....	3

CIBLE(S)

Infirmier(e)s Diplômé(e)s d'Etat (IDE) des Etablissements membres du Réseau Espace Santé Cancer Rhône-Alpes ou exerçant en milieu libéral.

REDACTEUR(S)**Membres du groupe de travail**

GUYON Danica, infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier de Valence - Valence ;
PORGE Sylvie, infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier de Belley - Belley ;
SEINCE Eliane, infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier St-Joseph-St-Luc - Lyon ;

Relecteurs :

CARMAGNAC S., infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier de Chambéry - Chambéry ;
HENRY F., directeur des soins, Infirmerie Protestante - Caluire et Cuire ;
LACOMBE I., infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier de Chambéry - Chambéry ;
PETTOELLO E., infirmière diplômée d'état, Centre Hospitalier de Chambéry - Chambéry ;
STANOWSKI D., cadre de santé, CRLCC Léon Bérard - Lyon.

I. DEFINITION

L'échographie permet la visualisation des organes par balayage à ultrasons. L'image obtenue correspond aux différences d'absorption des ultrasons par les tissus.

II. OBJECTIF

Exploration de l'abdomen et de tous les tissus mous dans un but diagnostique ou thérapeutique et pour la réalisation de ponction.

III. CONDITION

- Etre à jeun lors de l'échographie abdominale : minimum 6 heures pour l'adulte et l'adolescent, 3h pour un nouveau-né (prévoir un biberon), 4h pour un nourrisson, 5h pour un enfant, sauf en cas d'urgence.
- Avoir la vessie pleine lors d'une échographie pelvienne et vide pour une échographie endo-vaginale.

IV. PREPARATIONS

- Patient :
 - ✓ Expliquer au patient le déroulement de l'examen (application d'un gel incolore sur la zone à explorer).
 - ✓ Introduire une sonde dans les cavités naturelles pour certaines échographies.
 - ✓ Boire 0,5 litre d'eau une demi-heure avant l'examen pour une échographie pelvienne.
 - ✓ Clamper la sonde à demeure une heure avant l'examen pour avoir la vessie pleine si le patient en porte,
 - ✓ Faire un lavement type NORMACOL® en fonction du protocole du service si l'échographie prostatique ou endo rectale,
- Dossier :
 - ✓ Vérifier que le dossier du patient soit complet (Prescription d'échographie, bilan de coagulation si ponction prévue, etc....)

V. DEROULEMENT - DUREE.

- Environ 15 min en fonction de l'organe à visualiser.
- Patient en décubitus dorsal ou latéral.

VI. SURVEILLANCE

- Pas de surveillance particulière. S'assurer du déclampage de la sonde à demeure du patient.
- Reprise de l'alimentation sur avis médical.
- Locale, si ponction.
- Si Biopsie, surveillance à mettre en place, celle-ci est définie par le médecin radiologue en fonction de l'organe biopsé.