

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



FICHE D'INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS
« **PATIENT** »

Imatinib GLIVEC®

Notes personnelles




Présentation et conditions de prescription

- Deux présentations sont disponibles :
 - o Boite de 60 comprimés pelliculés à 100 mg
 - o Boite de 30 comprimés pelliculés à 400 mg
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- L'imatinib se prend :
 - o pour des doses de 400 à 600 mg en 1 prise.
 - o pour des doses de 800 mg en 2 prises (matin et soir).
- Les comprimés sont avalés avec un grand verre d'eau ou dispersés dans un verre d'eau minérale ou de jus de pomme, au cours d'un repas.



N'oubliez pas de bien faire votre prise de sang avant le renouvellement de votre ordonnance

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Laisser le comprimé dans son emballage jusqu'au moment de la prise.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés, prenez la dose habituellement prescrite le soir ou le jour suivant. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Noter l'incident.
- En cas d'apparition d'effets secondaires gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.

Alerte

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- Evitez le jus de pamplemousse et le millepertuis.

Gestion des principaux effets indésirables

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Très fréquents		
Diarrhée	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Nausées / vomissements	Continuer à boire beaucoup, reposez vous. Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.	Prendre les antiémétiques prescrits ou appelez votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.
Eruption cutanée, démangeaisons, assèchement.	Eviter l'exposition au soleil et utilisation d'une protection solaire adaptée. Utiliser un savon doux et une crème émolliente.	Alerter le médecin oncologue référent qui décidera ou non de la modification du traitement.
Prise ou perte de poids, œdème.	Surveiller votre poids	Contactez votre médecin en cas de modification de votre poids
Fatigue ou faiblesse, céphalées, vertiges	Repos. Exercices modérés (marche).	Prudence en cas de conduite de véhicule.
Fièvre, frisson, toux	Limiter le contact avec les personnes malades, vous laver les mains fréquemment, désinfecter vos plaies.	Contactez votre médecin en cas de température > 38°C.
Crampes musculaires	Boire beaucoup	Réversibles. Contactez votre médecin si besoin.