

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



FICHE D'INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS
« **PATIENT** »

Topotécan HYCAMTIN®

Notes personnelles




Présentation et conditions de prescription

- Deux présentations sont disponibles : boîtes de 10 gélules à 0, 25mg ; boîtes de 10 gélules à 1 mg.
- Conserver ce médicament au réfrigérateur (entre + 2 et 8°C), à l'abri de la lumière et tenir hors de portée des enfants. Prévoir un sac isotherme pour le transport.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- Les gélules de topotécan doivent être avalées en une prise par jour, pendant ou en dehors des repas.
- La posologie initiale est de 2,3 mg/m²/prise pendant 5 jours tous les 21 jours.
- La posologie d'entretien est de 0,4 mg/m²/prise pendant 5 jours tous les 21 jours jusqu'à progression de la maladie.



Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Si vous avez oublié de prendre vos gélules de topotécan, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Notez l'oubli sur le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets secondaires gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent sans attendre le terme des 21 jours. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.

Alerte

- Les femmes en âge de procréer doivent être informées qu'elles doivent éviter toute grossesse et allaitement pendant le traitement.
- Interactions médicamenteuses : vaccin anti-amaril et autres vaccins vivants atténués.

Topotécan HYCAMTIN® – réseau Espace Santé Cancer – version validée 10/12/2012- Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI). Copyright 2013 Réseau Espace Santé-Cancer. Tous droits réservés

Gestion des principaux effets indésirables

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Fièvre, frisson	Limitier les contacts avec les personnes malades.	Alerter le médecin référent en cas de température > 38°C ou si apparition de signes infectieux.
Saignements	Vous laver les mains, désinfecter les plaies. Eviter l'aspirine et les anti-inflammatoires.	Contactez rapidement le médecin si saignements inhabituels (ex : nez, gencives, crachats, selles noires...).
Diarrhée / constipation	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Nausées / Vomissements	Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits	Contactez votre médecin si besoin
Infection de la bouche	Maintenir une bonne hygiène buccale, utiliser une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas. Utiliser le bain de bouche prescrit par votre oncologue. Eviter les aliments acides, épicés et irritants.	Contactez votre médecin si besoin.
Fatigue Faiblesse, céphalées, vertiges...	Repos et exercices modérés (marche). Maintenir une bonne hygiène de vie.	Prudence si vous devez conduire.
Alopécie	Perte de cheveux très fréquente. Afin de limiter la perte des cheveux, utiliser une brosse molle et éviter les décolorations, permanentes et colorations. Les cheveux repoussent à l'arrêt de la chimiothérapie.	
Peu fréquents		
Hypersensibilité Rash, urticaire	Réaction anaphylactique très rare.	Alerter le médecin.