

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)



FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MEDICAMENTS  
« **PATIENT** »

**Sorafénib NEXAVAR®**

Notes personnelles



## Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 112 comprimés à 200 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

## Comment prendre ce médicament

- Le NEXAVAR se prend deux fois par jour à 12 h d'intervalle avec un verre d'eau, toujours au même moment. Il peut être pris pendant le repas si celui-ci est pauvre en graisses. Si le repas est riche en graisses, le prendre 1 heure avant, ou 2 heures après. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.

## Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux vendus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laisser les comprimés dans l'emballage initial jusqu'à la prise.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Si vous avez oublié de prendre votre NEXAVAR, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant. Noter l'oubli sur le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.



## Gestion des principaux effets indésirables

	<b>PREVENTION</b>	<b>CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE</b>
<b>Fréquents</b>		
<b>Diarrhée / constipation</b>	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
<b>Infection de la bouche</b>	Maintenir une bonne hygiène buccale, utilisez une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas. Utilisez le bain de bouche prescrit par votre oncologue. Eviter les aliments acides, épicés et irritants.	Contactez votre médecin si besoin.
<b>Nausées, vomissements</b>	Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits	Contactez votre médecin si besoin
<b>Rash, érythème, prurit, sécheresse cutanée</b>	Utiliser un savon doux. Appliquer souvent une crème hydratante sur vos pieds et vos mains.	
<b>Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.</b>	Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains (jardinage, bricolage, bijoux serrés). Porter des chaussures amples.	Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. En cas de douleurs ou si vos activités sont affectées, contactez votre médecin.
<b>Hypertension</b> <b>Alopécie partielle possible</b>		
<b>Moins fréquents</b>		
<b>Fièvre, frisson et toux</b>	Limites les contacts avec les personnes malades. Lavez vous les mains, désinfectez les plaies.	Contactez votre médecin en cas de température > 38°C.
<b>Arthralgies, myalgies</b> <b>Céphalées</b>		Prise de paracétamol si besoin.
<b>Peu fréquents</b>		
<b>Flush</b> <b>Saignements</b>		Appellez votre médecin