Cancer de l'endomètre

LES RÉFÉRENTIELS

Cancers Gynécologiques
Version validée 30 juin 2022

Cible(s)	Anatomopathologistes, chirurgiens généralistes, chirurgiens gynécologues, généticiens, gynécologues médicaux, gynécologues obstétriciens, internistes, médecins nucléaires, oncologues médicaux, pharmaciens, radiologues, radiothérapeutes, RCP gynécologie de la région.
Rédacteur(s)	<p>Coordination : CORNOU Caroline, chirurgien gynécologue, Centre Jean Perrin, Clermont Ferrand; HEINEMANN Mellie, chirurgien gynécologue, Centre Léon Bérard, Lyon, ROSSI Léa, chirurgien gynécologue, Centre Léon Bérard, Lyon</p> <p>Membres du groupe de travail « cancer de l'endomètre » 2022 : ALMARAZ MATEOS Stéfan, chirurgien gynécologue, CH Annecy Genevois; BENOIT Céline, radiothérapeute, Centre Jean Perrin, Clermont Ferrand; BERNARD Juliette, chirurgien gynécologue, CHU Grenoble Alpes; BLANC Sébastien, chirurgien gynécologue, CH Annecy Genevois; BONIN Lucie, chirurgien gynécologue, Hospices Civils de Lyon; BRUN Lucie, radiothérapeute, Centre Jean Perrin, Clermont Ferrand; CARBONNAUX Mélodie, oncologue médical, CH Annecy Genevois; CHAULEUR Céline, chirurgien gynécologue, CHU Saint Etienne; CORNOU Caroline, chirurgien gynécologue, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand; DEVOUASSOUX-SHISHEBORAN Mojgan, anatomopathologiste, Hospices Civils de Lyon; KUMAR Tami, radiothérapeute, CH Moulins; GERTYCH Witold, chirurgien gynécologue, Hospices Civils de Lyon; HEINEMANN Mellie, chirurgien gynécologue, Centre Léon Bérard, Lyon; HESS Nathalie, oncologue, Centre Jean Perrin, Clermont Ferrand; HOEN Nathalie, chirurgien gynécologue, Hospices Civils de Lyon; LABROSSE Hélène, Pharmacien chef de projets, réseau ONCOAURA; LANGRAND-ESQUIRE Julien, radiothérapeute, Centre Marie Curie, Valence; PENAULT LLORCA Frédérique, anatomopathologiste, Centre Jean Perrin; PERON Julien, oncologue, Hospices Civils de Lyon; PIERRIN Patsy, oncologue, Centre Jean Perrin, Clermont Ferrand; ROSSI Léa, chirurgien gynécologue, Centre Léon Bérard, Lyon; ROUSSET JABLONSKI Christine, gynécologue médical, Centre Léon Bérard, Lyon; SERRE Anne-Agathe, radiothérapeute, Centre Léon Bérard, Lyon; VACHER Laure, oncologue, Centre Jean Perrin, Clermont-Ferrand</p>
Contributeur(s)	Membres de la plénière du 30/06/2022 Liste des contributeurs

• Bilan diagnostic	4
• Classification moléculaire.....	5
• Type histologique des carcinomes endométriaux (OMS 2020).....	6
• Compte rendu d’histopathologie.....	7
• Niveau de risque selon classification histologique et moléculaire.....	8
• Bilan préthérapeutique	9
• Cancer de l’endomètre stade I, II.....	10
• Cancer de l’endomètre stade III, IVA.....	11
• Traitements adjuvants	12
• Traitements adjuvants – tumeurs risque intermédiaire haut.....	13
• Traitements adjuvants – tumeurs haut risque.....	14
• Traitements systémiques des tumeurs au stade métastatique.....	15
• Traitement des lignes métastatiques ultérieures	16
• Surveillance.....	17
• Surveillance des patientes présentant un syndrome de Lynch/HNPCC.....	18
• ANNEXES	
1 - Classification FIGO.....	20
2 - Caractéristiques des classes moléculaires.....	21
3 - Etudes immunohistochimiques, pour qui ? Quand ?.....	22
4- Niveau de risque selon classification histologique et moléculaire.....	23
5 - Modalités de traitement.....	25
• BIBLIOGRAPHIE.....	26

Bilan diagnostique

- Échographie pelvienne endovaginale,
- Biopsie endomètre à la pipelle de CORNIER®,
- Si échec ou impossibilité d'utilisation de la pipelle de CORNIER® : hystéroscopie (notant la dimension de la lésion et sa localisation par rapport à l'isthme) + biopsie endométriale sous contrôle hystéroscopique

Examen clinique

- Antécédents personnels et familiaux,
- Recherche du syndrome HNPCC* / Lynch :
 - patientes présentant un cancer de l'endomètre avant 50 ans (peut être discuté entre 50 et 60 ans),
 - patientes de tout âge si un apparenté au 1er degré a été atteint d'un cancer colorectal ou du spectre Hereditary non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC);
 → Pré-criblage somatique** de la tumeur à demander :
 Si phénotype MSI, indication de consultation d'oncogénétique
- Recherche de comorbidités,
- Examen abdominopelvien et ganglionnaire.

Classification moléculaires

[page 5](#)

Types histologiques

[page 6](#)

Classification FIGO

Annexe 1 → [page 20](#)

*Spectre Hereditary non Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) : colon, endomètre, grêle, ovaire, urothélium, estomac.

** Précriblage somatique de la tumeur : génotypage des séquences micro-satellites (recherche d'un phénotype MSI – Microsatellite Instability) et étude en immunohistochimie de l'expression des protéines MMR (recherche d'une perte d'expression)

ONCOFERTILITE
 lien vers référentiel régional
 Préservation de la fertilité

Diagnostic Cancer de l'endomètre

Préconisations

Sur biopsie (de préférence) ou pièce opératoire :
Etude IHC systématique :
Récepteurs œstrogènes / 4 protéines MMR / P53

Indication de recherche de mutation gène POLE (NGS*): Stade IB / II

- A discuter : Non endométrioïde
- Inutile: si Bas grade sans embole stade IA, Stades III/IV

***NGS : séquençage du domaine exonucléase du gène POLE**

si mise en évidence de plusieurs anomalies moléculaires chez une même patiente, les traitements adjuvants et le niveau de risque de la patiente sont établis en suivant l'arbre décisionnel (= POLE>dMMR>P53)

Caractéristiques des classes moléculaires
Annexe 2 – [page 21](#)
Etudes immunohistochimiques
Annexe 3 - [page 22](#)

Type histologique des carcinomes endométriaux (OMS 2020)

Carcinomes	Type Histologique (OMS 2020)	Grade
Endométrioides	<ul style="list-style-type: none"> Endométrioides Grades 1 et 2 Endométrioides Grade 3 	BAS GRADE
Non endométrioides	<ul style="list-style-type: none"> Séreux A cellules claires Indifférencié/dédifférencié Mixte (séreux ou CCC + autres qq soit le %age) Carcinosarcome Mésonephrique-like Mucineux gastro-intestinal Épidermoïde Neuroendocrine : grandes cellules petites cellules Neuroendocrine et non-neuroendocrine 	HAUT GRADE

Compte rendu d'histopathologie

Préconisations

- **Type histologique :**

Endométrioïde	Non endométrioïde : haut grade
• Bas grade (Grades 1-2) • Haut grade (Grade 3)	• Séreux • Cellules claires • Carcinosarcomes • Indifférencié/dédifférencié • Mixte (séreux ou CCC + autres qq soit le pourcentage) • Neuroendocrine • Épidermoïdes • Autres

- **Embole vasculaire :**

- Absente ou focale < 5
- Extensive ≥ 5

- **Stade FIGO**

- **Classification moléculaire**

POLE muté
MMR-déficient
P53 anormale
Non-spécifique

Niveau de risque selon classification histologique et moléculaire

Table 2 Definition of prognostic risk groups

Risk group	Molecular classification unknown	Molecular classification known*†
Low	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage IA endometrioid + low-grade‡ + LVSI negative or focal 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage I-II POLEmut endometrial carcinoma, no residual disease ▶ Stage IA MMRd/NSMP endometrioid carcinoma + low-grade‡ + LVSI negative or focal
Intermediate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage IB endometrioid + low-grade‡ + LVSI negative or focal ▶ Stage IA endometrioid + high-grade‡ + LVSI negative or focal ▶ Stage IA non-endometrioid (serous, clear cell, undifferentiated carcinoma, carcinosarcoma, mixed) without myometrial invasion 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage IB MMRd/NSMP endometrioid carcinoma + low-grade‡ + LVSI negative or focal ▶ Stage IA MMRd/NSMP endometrioid carcinoma + high-grade‡ + LVSI negative or focal ▶ Stage IA p53abn and/or non-endometrioid (serous, clear cell, undifferentiated carcinoma, carcinosarcoma, mixed) without myometrial invasion
High-intermediate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage I endometrioid + substantial LVSI regardless of grade and depth of invasion ▶ Stage IB endometrioid high-grade‡ regardless of LVSI status ▶ Stage II 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage I MMRd/NSMP endometrioid carcinoma + substantial LVSI regardless of grade and depth of invasion ▶ Stage IB MMRd/NSMP endometrioid carcinoma high-grade‡ regardless of LVSI status ▶ Stage II MMRd/NSMP endometrioid carcinoma
High	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage III-IVA with no residual disease ▶ Stage I-IVA non-endometrioid (serous, clear cell, undifferentiated carcinoma, carcinosarcoma, mixed) with myometrial invasion, and with no residual disease 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage III-IVA MMRd/NSMP endometrioid carcinoma with no residual disease ▶ Stage I-IVA p53abn endometrial carcinoma with myometrial invasion, with no residual disease ▶ Stage I-IVA NSMP/MMRd serous, undifferentiated carcinoma, carcinosarcoma with myometrial invasion, with no residual disease
Advanced metastatic	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage III-IVA with residual disease ▶ Stage IVB 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stage III-IVA with residual disease of any molecular type ▶ Stage IVB of any molecular type

*For stage III-IVA **POLEmut** endometrial carcinoma and stage I-IVA **MMRd** or **NSMP** clear cell carcinoma with myometrial invasion, insufficient data are available to allocate these patients to a prognostic risk group in the molecular classification. Prospective registries are recommended.
 †See text on how to assign double classifiers (eg, patients with both **POLEmut** and **p53abn** should be managed as **POLEmut**).
 ‡According to the binary FIGO grading, grade 1 and grade 2 carcinomas are considered as low-grade and grade 3 carcinomas are considered as high-grade.
 LVSI, lymphovascular space invasion; **MMRd**, mismatch repair deficient; **NSMP**, non-specific molecular profile; **p53abn**, p53 abnormal; **POLEmut**, polymerase-mutated.

Autre présentation
du niveau de risque
Annexe 3
→ [pages 23 et 24](#)

Concin N, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. Int J Gynecol Cancer. 2021 Jan;31(1):12-39

Bilan pré-thérapeutique

Examens d'imagerie

- IRM pelvienne et rétropéritonéale pour stadification préchirurgicale selon FIGO.
- Scanner abdominopelvien associé à une échographie pelvienne en cas de contre indication à l'IRM.
- Scanner TAP ou TEP-FDG , si :
 - Type histologique non endométrioïde
 - Endométrioïde de haut grade
 - Adénopathie suspecte en IRM pelvienne
 - Suspicion de métastases

Examens biologiques

- Dosage du CA 125 conseillé en cas de suspicion d'extension régionale ou à distance

Evaluation oncogériatrique éventuelle pour les patients de plus de 75 ans.

ONCOFERTILITE
lien vers référentiel régional
Préservation de la fertilité

Traitement adjuvants

Tumeurs bas risque

Préconisations

- Pas de traitement adjuvant

Tumeurs risque intermédiaire

Préconisations

- Curiethérapie
- Option si patiente < 60 ans : surveillance

Tumeurs risque intermédiaire haut

[page 13](#)

Tumeurs haut risque

[page 14](#)

Tumeurs stade métastatique

[page 15](#)

Surveillance

[page 17](#)

- Cas particulier :** Endométrioïdes IA endométrial et IA ovarien synchrones de bas grade et sans embole
- Pas de traitement adjuvant

Modalités de traitement
Annexe 5
→ [page 25](#)

Surveillance
[page 17](#)

*curiethérapie recommandée si:

- envahissement cervical et/ou vaginal et/ou paramétrial
- R1

Traitement adjuvant des tumeurs haut risque**Préconisations**

- Séquentiel : Chimiothérapie : 6 cures CARBOPLATINE PACLITAXEL puis RTE pelvienne +/- lombo-aortique (stade III C2)
- Ou Radio chimiothérapie concomitante : 2 cures CISPLATINE 50mg/m² J1=J21 + RTE puis 4 cures CARBOPLATINE-PACLITAXEL

Option à discuter:

- Curiethérapie complémentaire*
- Chimiothérapie seule: 6 cures CARBOPLATINE PACLITAXEL

*curiethérapie recommandée si:

- envahissement cervical et/ou vaginal et/ou paramétrial
- R1

Modalités de traitement

Annexe 5
→ [page 25](#)

Surveillance

[page 17](#)

Modalités de traitement
Annexe 5
→ [page 25](#)

Surveillance
[page 17](#)

Traitement des lignes métastatiques ultérieures**Préconisations**

Choix du traitement basé sur:

- l'intervalle de temps libre après platine en 1ere ligne
- La biologie moléculaire (P53, MMR)
- Les traitements déjà reçus
- Les toxicités résiduelles

- Lenvatinib 20mg par jour + Pembrolizumab 200 mg IV J1=J21
- Ou Bi-chimiothérapie : réintroduction d'un sel de platine si PFI > 6 mois

Options

- Monochimiothérapie : Doxorubicine ou Paclitaxel
- Hormonothérapie palliative si RH+

Essai clinique à proposer selon profil moléculaire spécifique

**Modalités de
traitement**

Annexe 5
→ [page 25](#)

Surveillance

[page 17](#)

Surveillance

Examens	Pendant les 2-3 premières années	3 à 5 ans	Après les 5 premières années
Examen gynécologique avec exploration de la totalité du vagin, cicatrice du fond vaginal, les touchers pelviens et la palpation des aires ganglionnaires	<ul style="list-style-type: none"> • Si bas risque : tous les 6-12 mois • Autres: tous les 3 à 4 mois 	<ul style="list-style-type: none"> • Stade I, II : 1 fois par an • Stade III, IV : tous les 6 à 12 mois 	1 fois par an
Autres examens (TDM TAP, IRM...)	Si symptomatologie clinique d'appel		
	Options : Stade III-IV : TDM TAP aux 6 mois puis annuel		Option : TDM TAP / an
CA125	Uniquement si élévation initiale Rythme de surveillance parallèlement à la clinique		
<p align="center">Prise en charge des facteurs de risques <i>Règles hygiéno-diététiques : arrêt du tabac, activités physiques, prise en charge surpoids...</i></p> <p align="center">Prévention des effets secondaires des traitements <i>Sténose vaginale, sexologie, dépression...</i></p>			

Surveillance des patientes présentant un syndrome de Lynch/HNPCC

Examens	À partir de 30 ans
<ul style="list-style-type: none"> • Interrogatoire soigneux • Education / symptômes • Examen gynécologique et sénologique, examen au speculum / TV / abdominal 	Annuel
Biopsie endomètre à la pipelle	Tous les 1 à 2 ans
Echographie pelvienne avec mesure de l'épaisseur endométriale	Annuelle
Hystéroskopie diagnostique	Devant toute symptomatologie ou toute anomalie échographique

-**Tout saignement gynécologique anormal** doit conduire à une consultation gynécologique rapide et à des explorations.

- Une **hystéroskopie diagnostique** peut éventuellement être discutée en dépistage, notamment en cours de coloscopie, chez les femmes n'ayant pas opté pour la chirurgie prophylactique, et sera à envisager devant toute symptomatologie anormale ou toute anomalie échographique

-**Une chirurgie prophylactique** (hystérectomie totale non conservatrice) peut être discutée après accomplissement des projets de grossesse, plutôt à partir de 40-45ans (ou 5 ans avant le cancer endométrial le plus précoce). Un traitement hormonal substitutif peut être proposé.

-Il n'y a **pas de contre-indication aux contraceptions hormonales ou aux projets de procréations médicalement assistées**. Le stérilet progestatif peut être proposé.

- Il n'y a **pas de contre-indication à modifier un traitement hormonal substitutif** en post-ménopause.

ANNEXES

Annexe 1 – Classification FIGO (2018)

Stade I	Tumeur limitée au corps utérin
IA	Tumeur limitée à l'endomètre ou envahissant moins de la moitié du myomètre
IB	Tumeur envahissant la moitié ou plus du myomètre
Stade II¹	Tumeur envahissant le stroma cervical sans dépasser les limites de l'utérus
Stade III	Extensions locales et/ou régionales selon les caractéristiques suivantes :
IIIA	Envahissement tumoral de la séreuse du corps utérin ou des annexes (extension directe ou métastatique) ²
IIIB	Envahissement vaginal ou des paramètres (extension directe ou métastatique) ²
IIIC	Atteinte des ganglions lymphatiques pelviens ou para-aortiques ²
	IIIC1 Atteinte des ganglions lymphatiques pelviens
	IIIC2 Atteintes des ganglions lymphatiques para-aortiques avec ou sans atteinte des ganglions pelviens
Stade IV³	Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale et/ou métastases à distance
IVA	Extension à la muqueuse vésicale et/ou intestinale
IVB	Métastases à distance incluant les métastases intra-abdominales et/ou ganglions inguinaux excluant les métastases vaginales, annexielles ou séreuses pelviennes

1- L'envahissement glandulaire endocervical doit être considéré comme un stade I

2- Les résultats de la cytologie péritonéale doivent être rapportés séparément et ne modifient pas la classification.

3- Un œdème bulleux en cystoscopie est insuffisant pour être considéré comme un stade IV ([NCCN, 2019](#)).

Annexe 2 - Caractéristiques classe moléculaire

	Prévalence estimée	Caractéristiques	Pronostic Estimation de la SSP à 5 ans
« serous like » incluant des carcinomes endométriodes	26 %	carcinome avec un profil génomique complexe et faible charge mutationnelle, mutation du gène TP53 identifiée dans plus de 90 % de ces tumeurs	Mauvais 50 %
« hypermuté/dMMR »	28 %	nombre très élevé de mutations en lien avec une instabilité microsatellitaire et pronostic intermédiaire	Intermédiaire 70 % Éligibles à l'immunothérapie
« ultramuté/POLE »	7 %	taux extrêmement élevé de mutations	Excellent 100 % non répondeur à la chimiothérapie
« NSMP – sans profil moléculaire spécifique »	39 %	microsatellitaires stables avec très rares mutations délétères de TP53 et altérations fréquentes des voies de signalisation P13K/AKT	Intermédiaire 80 %

Cancer Genome Atlas Research Network, Kandoth C, et al. Integrated genomic characterization of endometrial carcinoma. *Nature* 2013; 497:67–73. Concin N, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. *Int J Gynecol Cancer* 2021; 31:12–39.

Annexe 3 - Etudes immuno-histochimiques pour qui et quand?

- Dès le diagnostic primaire sur matériel de curetage (pré analytique optimale)
 - Récepteurs aux oestrogènes (à visée thérapeutique et diagnostique)
 - Les 4 protéines MMR (classification moléculaire, Lynch, ImmunoTTT)
 - P53 (classification moléculaire et à visée diagnostique)

Protéines MMR Immunohistochimie:

- Perte d'expression d'une ou plusieurs protéines = MMR-déficient (cs oncogénétique pour ESGO, confirmation par Bio mol MSI pour INCa)
- Expression conservée des 4 protéines = MMR-proficient
- Perte MLH1/PMS2 = recherche hyperméthylation du promoteur MLH1
 - si hyperméthylé : sporadique
 - si non hyperméthylé : cs oncogénétique
- Expression immunohistochimique hétérogène ou ambiguë : biologie moléculaire à la recherche de MSI

Kobel et al
Int J GP 2018, 38

**P53 profil
d'expression :**

A : sauvage ou
normal

B, C, D : Muté
ou anormal

Annexe 4 - Niveau de risque selon classification histologique et moléculaire

WITHOUT MOLECULAR CLASSIFICATION

	ENDOMETRIOID				NON- ENDOMETRIOID
	LOW GRADE		HIGH GRADE		
	LVSI -	LVSI +	LVSI -	LVSI +	
STAGE IA	LOW	H-I	INTERM	H-I	MYO-: INTERM MYO+: HIGH
STAGE IB	INTERM	H-I	H-I		HIGH
STAGE II	H-I		H-I		HIGH
STAGE III-IVA	HIGH		HIGH		HIGH
STAGE III-IVA with residual disease	ADVANCED		ADVANCED		ADVANCED
STAGE IVB	ADVANCED		ADVANCED		ADVANCED

Figure 1 Pocket memo based on European Society of Gynecological Oncology (ESGO), European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), and European Society of Pathology (ESP) endometrial guidelines. Definition of prognostic risk groups, molecular classification unknown. Low grade: grade 1–2; high grade: grade 3; non-endometrioid: serious carcinoma, clear cell carcinoma, undifferent carcinoma, carcinosarcoma, or mixed carcinoma. H-I, high-intermediate; INTERM, intermediate; LVSI, lymphovascular space invasion; LVSI+, presence of tumor cells >5 lymphovascular spaces, multifocal or diffuse; LVSI-, negative LVSI or presence of a single focus around the tumor; MYO-, without myometrial invasion; MYO+, with myometrial invasion.

Daix M, et al. Int J Gynecol Cancer 2021;31:1615–1616.

Annexe 4 - Niveau de risque selon classification histologique et moléculaire

WITH MOLECULAR CLASSIFICATION

	ENDOMETRIOID						NON- ENDOMETRIOID MMRd/NSMP	
	POLEmut		MMRd/NSMP					p53abn
	LOW GRADE	HIGH GRADE	LOW GRADE		HIGH GRADE			
			LVSI -	LVSI +	LVSI -	LVSI +		
STAGE IA	LOW		LOW	H-I	INTERM	H-I	MYO-: INTERM MYO+: HIGH	MYO-: INTERM MYO+: HIGH*
STAGE IB	LOW		INTERM	H-I	H-I		HIGH	HIGH*
STAGE II	LOW		H-I				HIGH	HIGH*
STAGE III-IVA	Insufficient data		HIGH				HIGH	HIGH*
STAGE III-IVA <small>with residual disease</small>	ADVANCED		ADVANCED				ADVANCED	ADVANCED
STAGE IVB	ADVANCED		ADVANCED				ADVANCED	ADVANCED

Figure 2 Pocket memo based on European Society of Gynecological Oncology (ESGO), European Society for Radiotherapy and Oncology (ESTRO), and European Society of Pathology (ESP) endometrial guidelines. Definition of prognostic risk groups, molecular classification known. *stage I–IVA clear cell carcinoma: insufficient data. POLE and p53: should be managed as POLE. MMRd, mismatch repair deficient; NSMP, non-specific molecular profile; POLEmut, polymerase-mutated; p53abn, p53 abnormal.

Daix M, et al. *Int J Gynecol Cancer* 2021;31:1615–1616.

Annexe 5 - Modalités de traitement

RADIOTHERAPIE

Doses : 45 à 48,6 GY en 25 à 27 fractions

CHIMIOOTHERAPIE *

Standard: CARBOPLATINE AUC5 - PACLITAXEL 175 mg/m² tous les 21 jours

Options:

- CISPLATINE 50mg/m²- DOXORUBCINE 60mg/m² tous les 21 jours
- CISPLATINE 50mg/m²- DOXORUBCINE 45mg/m²- PACLITAXEL 160 mg/m² tous les 21 jours
- Monothérapie DOXORUBCINE 60mg/m² **ou** CISPLATINE 60mg/m² tous les 21 jours chez les patientes fragiles

HORMONOTHERAPIE

Progestatifs: acétate de mégestrol 160 mg/jour

Options

Tamoxifène, agonistes LH/RH, inhibiteurs de l'aromatase

***Absence d'arguments pour adapter le protocole au type histologique**

Bibliographie

- Banerjee S, Moore KN, Colombo N, et al. Maintenance olaparib for patients with newly diagnosed advanced ovarian cancer and a BRCA mutation (SOLO1/GOG 3004): 5-year follow-up of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. *Lancet Oncol.* 2021;22(12):1721. Epub 2021 Oct 26.
- Burger RA, Brady MF, Bookman MA, et al. Incorporation of bevacizumab in the primary treatment of ovarian cancer. *Gynecologic Oncology Group N Engl J Med.* 2011 Dec;365(26):2473-83.
- Chan JK, Tian C, Fleming GF et al. The potential benefit of 6 vs. 3 cycles of chemotherapy in subsets of women with early -stage high-risk epithelial ovarian cancer: an exploratory analysis of a Gynecologic Oncology Group study. *Gynecol Oncol* 2010; 116(3): 301–306.
- Concin N, et al. ESGO/ESTRO/ESP guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma. *Int J Gynecol Cancer.* 2021 Jan;31(1):12-39
- Chargari C, et al. Radiotherapy for endometrial cancer. *Cancer Radiother.* 2022 Feb-Apr;26(1-2):309-314
- González-Martín A, Pothuri B, Vergote I, et al. Niraparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. *N Engl J Med.* 2019;381(25):2391. Epub 2019 Sep 28
- Matulonis UA, Harter P, Gourley C, et al. Olaparib maintenance therapy in patients with platinum-sensitive, relapsed serous ovarian cancer and a BRCA mutation: Overall survival adjusted for postprogression poly(adenosine diphosphate ribose) polymerase inhibitor therapy. *Cancer.* 2016 Jun;122(12):1844-52. Epub 2016 Apr 8.
- Moore K, Colombo N, Scambia G, et al. Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer *N Engl J Med.* 2018;379(26):2495. Epub 2018 Oct 21.
- Oza AM, Cook AD, Pfisterer J, et al. Standard chemotherapy with or without bevacizumab for women with newly diagnosed ovarian cancer (ICON7): overall survival results of a phase 3 randomised trial. *Lancet Oncol.* 2015 Aug;16(8):928-36. Epub 2015 Jun 23.
- Perren TJ, Swart AM, Pfisterer J, et al. A phase 3 trial of bevacizumab in ovarian cancer. *N Engl J Med.* 2011 Dec;365(26):2484-96.
- Ray-Coquard I, Pautier P, Pignata S, et al. Olaparib plus Bevacizumab as First-Line Maintenance in Ovarian Cancer. *N Engl J Med.* 2019;381(25):2416.
- Recommandations FRANCOGYN, CNGOF : *Gynecol Obstet Fert Senol* 2019; 47; 155–167 et *J Gynecol Obstet and Human Reproduction* 2019; 48: 369–378
- Recommandations St Paul 2019: *Bull Cancer* 2021; 108: S33–S38
- Germline and Somatic Tumor Testing in Epithelial Ovarian Cancer: ASCO Guideline *J Clin Oncol* 38:1222-1245.
- Recommendations from the International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR) *Modern Pathology* 2015;28, 1101–1122

BIOPARC/ADENINE
60 avenue Rockefeller
69373 LYON Cedex 08

☎ Tél. : 04 27 82 85 10

✉ reseau@onco-aura.fr 🌐 onco-aura.fr