

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)

**FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MEDICAMENTS  
« PATIENT »**

**Sunitinib SUTENT®**

Notes personnelles




## Présentation et conditions de prescription

- Boîtes de 28 gélules : 3 dosages disponibles : 50 mg ; 25 mg ; 12,5 mg
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

## Comment prendre ce médicament

- Le SUTENT® se prend une fois par jour, toujours au même moment, pendant ou en dehors d'un repas, en continu pendant 28 jours suivi d'une pause de 14 jours. Les gélules ne doivent pas être ouvertes.



## Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laissez les gélules dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Si vous avez oublié de prendre votre SUTENT, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Notez l'oubli sur le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.



## Gestion des principaux effets indésirables

### PREVENTION

### CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

#### Fréquents

**Pigmentation de la peau (jaunâtre), pigmentation ou dépigmentation des cheveux ; Sécheresse cutanée ; rash. Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds.**

Pigmentation et dépigmentation réversibles à l'arrêt du traitement. Utiliser un savon doux. Appliquer souvent une crème hydratante sur les pieds et les mains. Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains. Non douloureux ; réversible en quelques mois même si poursuite traitement.

Il s'agit d'un syndrome mains-pieds. En cas de douleurs ou si vos activités sont affectées, contacter votre médecin.

**Hémorragie en flammèche sur ongles.**

**Diarrhée**

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.

Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si selles liquides. Alerter votre médecin traitant si plus de 4 selles par jour.

**Ulcération de la bouche**

Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisane, bouillon).

Bain bouche sans alcool (+anesthésique local).

**Altération du goût possible**

Bonne hygiène buccale, utiliser brosse à dents souple et dentifrice doux (sans menthol) Réversible à l'arrêt de traitement.

Si ulcérations ou bouche douloureuse, contacter votre médecin.

**Arthralgie, myalgie**

Prise de paracétamol.

**Fatigue importante**

Repos et exercices modérés (marche)

Alerter votre médecin traitant pour contrôle biologique fonction thyroïdienne.

#### Moins fréquents

**Fièvre, frisson et toux**

Limitier le contact avec les personnes malades, vous laver les mains, désinfecter vos plaies.

Contactez votre médecin en cas de température > 38°C.

**Nausées, vomissements**

Boire beaucoup. Prendre les antiémétiques prescrits

Contactez votre médecin si besoin.

#### Peu fréquents

**Douleur thoracique**

**Cesser** votre traitement et appelez votre médecin