

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

**FICHE D'INFORMATION
SUR LES MEDICAMENTS
« PATIENT »**

Erlotinib TARCEVA®

Notes personnelles



Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 30 comprimés dosés à 25, 100, 150 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- L'administration se fait en une prise par jour, au même moment tous les jours, de préférence à distance des repas.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Laisser le comprimé dans son emballage jusqu'au moment de la prise.
- Ne pas écraser ou mâcher les comprimés.
- Si vous avez oublié de prendre vos comprimés, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Notez l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident dans le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



Alerte

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- Evitez le jus de pamplemousse et le millepertuis.

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

► Fréquents

Eruption cutanée, acné, démangeaisons, assèchement (peut être prédictif de l'efficacité du traitement)

Utiliser un savon doux. Appliquer souvent une crème hydratante sur vos mains et sur vos pieds

Contactez votre médecin si besoin.

Ongles fragilisés

Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains (jardinage, bricolage, bijoux serrés)

Nausées / vomissements

Boire beaucoup. Prendre les anti-émétiques prescrits

Contactez votre médecin si besoin

Diarrhée

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

Dyspnée, toux

Eviter le contact avec les personnes malades.

Contactez votre médecin en cas d'apparition d'une toux

Modification de la chevelure

Apparition sur le long terme.