

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes
Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PROFESSIONNELS DE SANTÉ** »

Notes personnelles

Abiratérone acétate ZYTIGA®



Type de produit, indications et conditions de prescription

- L'abiratérone est un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes
- Indications 2015 :
 - ✓ Cancer métastatique de la prostate résistant à la castration en association avec la prednisone (ou la prednisolone) chez :
 - l'homme adulte asymptomatique ou peu symptomatique après échec d'un traitement par suppression androgénique et pour lequel la chimiothérapie n'est pas encore cliniquement indiquée
 - l'homme adulte dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.
- Posologie usuelle : 1000 mg en une prise par jour associés à 5 mg deux fois par jour de prednisone (ou de prednisolone).
- Dosage disponible : Comprimés à 250 mg.
- Modalité de prise : L'abiratérone doit être avalée en entier (ni écrasée, ni mâchée) avec un verre d'eau en dehors des repas (au moins 1h avant ou 2h après un repas) de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie.
 - Dispensation dans les pharmacies de ville

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les comprimés.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.



Alertes

- Les femmes enceintes ou susceptibles de l'être ne doivent pas manipuler les comprimés. Il est recommandé d'utiliser une contraception efficace pendant le traitement.
- Ce médicament est inhibiteur enzymatique du CYP 2D6 (interactions avec métoprolol, propranolol, désipramine, venlafaxine, halopéridol, rispéridone, propafénone, flécaïnide, codéine, oxycodone et tramadol)

Gestion des principaux effets indésirables

Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Très fréquents		
Infection du tractus urinaire	Mécanisme d'apparition inexpliqué. Surveillance (effet indésirable très fréquent). Hygiène générale.	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38,5°C qui décidera ou non de la modification du traitement
Troubles minéralocorticoïdes : hypokaliémie, hypertension artérielle, oedèmes périphériques, Toxicité hépatique	Vérifier la bonne prise concomitante de corticoïde. Maintien de la kaliémie > 4 mmol/l	Arrêt du traitement si troubles ≥ grade 3. Alerter le médecin prescripteur
Hyperglycémie,	Surveillance biologique régulière.	Arrêt du traitement si augmentation >5 fois la valeur normale. Alerter le médecin prescripteur Régime alimentaire ou consultation diététique si besoin. - Possibilité de manifestations cardiotoxiques (infarctus, angine de poitrine, trouble du rythme...): prise en charge en urgence. Informé avec le médecin prescripteur
Douleurs thoraciques		réévaluer le Traitement anti-diarrhéique
Diarrhée	- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. - Eviter le café, le lait, l'alcool. - Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	
Autres effets indésirables fréquents : dyspepsie, hématurie, fractures, rash, hypertriglycéridémie.	Surveillance	Alerter le médecin prescripteur référent qui décidera ou non de la modification du traitement

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament