

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Afatinib GIOTRIF®



Notes personnelles

Présentation et conditions de prescription

- Boîtes de 28 comprimés dosés à 20, 30, 40 ou 50 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- L'afatinib se prend une fois par jour avec un verre d'eau, en dehors des repas : les aliments ne doivent pas être consommés au moins 3 h avant et 1 h après la prise du comprimé. Le traitement se prend en continu tous les jours.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés.
- Ne pas écraser les comprimés. Si vous ne pouvez pas avaler les comprimés, il est possible de les dissoudre dans un grand verre d'eau (laisser au moins 15 minutes dans l'eau en agitant de temps à autre), sans écraser le comprimé.
- Laissez les comprimés dans leur emballage jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de GIOTRIF® :
 - Si la prochaine dose est dans plus de 8 heures : prenez votre comprimé
 - Si la prochaine prise est dans moins de 8 heures : ne prenez pas le comprimé oublié et reprenez à l'heure habituelle votre traitement.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



Alerte

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.

Gestion des principaux effets indésirables

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Troubles de la vision	Possible apparition d'un trouble visuel (larmoiement, sensibilité à la lumière, douleur et/ou rougeur de l'œil, vision floue...). Le port de lentilles de contact doit être évité, facteur de risque de kératite et d'ulcération.	Si apparition des signes, contacter rapidement un ophtalmologue.
Diarrhée	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons)	Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Démangeaisons, éruption cutanée, assèchement	Utiliser un savon doux. Appliquez souvent une crème hydratante.	Contactez votre médecin si apparitions de bulles, vésicules ou exfoliations sévères.
Hépatite Elévation des tests biologiques hépatiques	Surveillance du bilan biologique hépatique toutes les 2 semaines en début de traitement	En fonction des résultats, le traitement sera adapté par votre oncologue.
Toux, dyspnée, fièvre		Contactez votre médecin si apparitions des signes.
Saignements de nez	Pratiquer régulièrement les bilans sanguins et le suivi des paramètres de coagulation si vous êtes sous anticoagulants. Etre attentif aux saignements. Eviter l'aspirine.	Compression avec le doigt de la narine. Contactez votre médecin en cas d'apparition de signes hémorragiques.