

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMéDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Notes personnelles

Axitinib INLYTA®



Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 56 comprimés dosés à 1 mg, 3 mg, 5 mg ou 7 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière ;
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier.
- Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- L'axitinib se prend en 2 prises par jour, toutes les 12h, avec un verre d'eau. Il peut être pris pendant ou en dehors des repas. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.
- Pour les moments de prise, choisir un moment dans la journée qui vous permettra de ne pas oublier les prises de médicament.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laissez les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des comprimés
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident.
- N'oublier pas de faire pratiquer les prises de sang éventuellement prescrites.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez-vous en rapport avec votre médecin sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.



Alerte

- Une contraception doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à une semaine après l'arrêt du traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (jus, fruit) et le millepertuis au cours de votre traitement.

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

▸ Fréquents

Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds

- Utiliser un savon doux. Appliquez souvent une crème hydratante sur vos pieds et vos mains.
- Eviter l'exposition au soleil (écran total) et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains (jardinage, bricolage, bijoux serrés..).
- Porter des chaussures amples.

En cas de gêne, de douleurs ou si vos activités sont affectées, contacter votre médecin.

Nausées, vomissements

- Essayer de boire souvent, par petites quantités
- Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.

Prendre les anti-émétiques prescrits Appeler votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.

Diarrhée

- Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.
- Eviter le café, le lait, l'alcool.
- Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

Stomatite

- Maintenir une bonne hygiène buccale ; utiliser une brosse à dents souple et un dentifrice sans menthol après chaque repas. Utiliser le bain de bouche prescrit.

Si ulcération de la bouche ou bouche douloureuse, contacter votre médecin.

Constipation

- Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...), alimentation riche en fibre et activité physique.

Prendre le traitement laxatif prescrit.

Etourdissements, vertiges

- Ayez une bonne hygiène de vie. Ne pas boire d'alcool.

Prudence si vous devez conduire.

Fatigue

- Repos
- Pratiquez des exercices modérés (marche).

Céphalées Arthralgies, myalgies

Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1gramme par prise, maximum 4 fois par jour).
Contacter votre médecin si les symptômes persistent.

Saignements de nez, crachats de sang, sang dans les urines

- Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine.

Contacter rapidement votre médecin si saignements inhabituels (ex : nez, urine...).

Hypertension

- Effectuer une mesure régulière de votre tension artérielle.(automesure ou par un professionnel de santé).

Contacter votre médecin si la tension augmente.

Troubles de la voix possible