

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,  
des Dispositifs Médicaux  
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« PATIENT »

Céritinib ZYKADIA®



Notes personnelles

## Présentation et conditions de prescription

- Boîtes de 150 gélules dosées à 150 mg
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

## Comment prendre ce médicament

- Le céritinib se prend une fois par jour, à la même heure de la journée, à distance des repas (+/- 2heures). Le traitement se prend en continu.

## Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Ne pas dissoudre ou ouvrir les gélules.
- Laissez les gélules dans leur emballage jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous avez oublié de prendre les gélules de céritinib, prendre la dose suivante à l'heure habituelle le lendemain sans augmenter celle-ci. Noter l'oubli dans votre carnet :
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident dans le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



## Alerte

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Éviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du traitement.

## Gestion des principaux effets indésirables

### PREVENTION

### CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

#### ▸ Fréquents

##### **Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin**

Reposez-vous souvent.  
- Limiter les contacts avec les personnes malades.  
- Lavez-vous les mains fréquemment.  
- Désinfecter vos plaies.  
Un bilan sanguin sera réalisé tous les mois.

En présence de signes infectieux : température > 38,5 °C, frissons, toux, brûlures urinaires, contacter immédiatement le médecin.

##### **Saignements, hématomes Diminution des plaquettes de votre bilan sanguin**

Évitez les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...)

Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (nez, urine...)

##### **Affections hépatiques : élévation des tests biologiques relatifs au foie Toux, difficultés à respirer**

Surveillance du bilan hépatique biologique tous les mois

Peut nécessiter une adaptation de dose ou un arrêt temporaire du traitement

Contactez au plus vite votre médecin

##### **Diarrhées**

- Éviter les aliments trop chauds, épicés et frits.  
- Éviter le café, le lait, l'alcool.  
- Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

- Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si 1 à 2 selles liquides par jour.  
- Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

##### **Nausées et vomissements**

- Essayer de boire souvent, par petites quantités  
- Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.

- Prendre les antiémétiques prescrits. Appeler votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.

#### ▸ Peu fréquents

##### **Douleur thoracique**

Prévenir immédiatement votre médecin.