

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PATIENT** »

Crizotinib XALKORI®



Notes personnelles

Présentation et conditions de prescription

- Boîtes de 60 gélules dosées à 200 mg ou 250 mg.
- Conserver ce médicament à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- Le crizotinib se prend deux fois par jour, à intervalle de 12h, pendant ou en dehors des repas. Le traitement se prend en continu.
- La posologie est une gélule le matin et une gélule le soir.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation des gélules.
- Ne pas écraser, dissoudre ou ouvrir les gélules.
- Laissez les gélules dans leur emballage jusqu'au moment de la prise.
- Tenir hors de portée des enfants. Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de XALKORI® :
 - Si la prochaine dose est dans plus de 6 heures : prenez votre gélule
 - Si la prochaine prise est dans moins de 6 heures : ne prenez pas la gélule oubliée et reprenez à l'heure habituelle votre traitement.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident dans le carnet de suivi.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin sans attendre. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



Alerte

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus), le millepertuis au cours du traitement

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

▸ Fréquents

Troubles de la vision	Possible apparition d'un trouble du champ visuel (trainées lumineuses, baisse de l'acuité visuelle), notamment lors des changements de luminosité, réversible à l'arrêt du traitement.	Faire un bilan initial avec l'ophtalmologiste (test d'acuité visuelle, fond d'œil) Si apparition des signes, en parler avec votre médecin.
------------------------------	--	---

Diarrhée	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
-----------------	---	--

Constipation	Privilégier une alimentation riche en fibres. Pratiquer une activité physique régulière. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	Prendre le traitement laxatif prescrit.
---------------------	---	---

Hépatite Elévation des tests biologiques hépatiques	Surveillance du bilan biologique hépatique toutes les 2 semaines en début de traitement	En fonction des résultats, le traitement sera adapté par votre médecin.
---	---	---

Fatigue ou étourdissements	Pratiquer des exercices modérés (marche)	Prudence si vous devez conduire.
-----------------------------------	--	----------------------------------

Fièvre, frisson Saignements	Limitier le contact avec les personnes malades. Se laver les mains fréquemment, Désinfecter vos plaies. Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine.	Contacter le médecin en cas de température > 38°C. Contacter rapidement votre médecin si saignements inhabituels (ex : nez, gencive...).
--	--	---

Toux, dyspnée		Contacter votre médecin
----------------------	--	-------------------------

▸ Peu fréquents

Douleur thoracique		Prévenir immédiatement votre médecin.
---------------------------	--	--