

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes
Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PROFESSIONNELS DE SANTÉ** »

Enzalutamide XTANDI®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- L'enzalutamide est un puissant inhibiteur de la voie de signalisation des récepteurs aux androgènes.
- Indications 2015 :
 - o Cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration chez :
 - l'homme adulte dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de docétaxel.
 - l'homme adulte asymptomatique ou peu symptomatique après échec d'un traitement par suppression androgénique.
- Posologie usuelle : 160 mg en une prise par jour.
- Dosage disponible : Capsules à 40 mg.
- Modalités de prise : L'enzalutamide doit être avalé entier (ni écrasé, ni croqué, ni mâché, ni dilué, ni ouvert) avec un verre d'eau, au cours ou en dehors des repas, de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - o Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie.
 - o Dispensation exclusivement dans les pharmacies de ville

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les capsules molles.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante dès que possible ; sinon reprendre le médicament dès le lendemain à l'heure de prise habituelle.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.



Alertes

- Les hommes et les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteur du CYP 3A4](#)
- Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteur de la P-gP
- [Interactions avec les médicaments susceptibles d'allonger l'espace QT](#)

Gestion des principaux effets indésirables

- **Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.**
- **Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.**

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
▸ <u>Très fréquents</u>		
Toxicité neurologique (fatigue, céphalées, ...)	- Repos fréquent. - Exercices modérés (marche). Conserver une activité physique modérée (marche 30 min) est recommandée.	
Troubles hormonaux : bouffées de chaleur	Transmettre les conduites de prévention vis-à-vis des déclencheurs des bouffées de chaleur (limiter exposition à la chaleur, caféine, épices, alcool...)	
Hypertension artérielle	- Surveillance de la tension artérielle régulièrement.	- Traitement antihypertenseur

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament