

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes
Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Olaparib LYNPARZA®



Notes personnelles

Type de produit, indications et conditions de prescription

- L'Olaparib est une thérapie ciblée, inhibiteur des Poly (ADP ribose) Polymérasés humains (PARP)
- Indications 2015 : Traitement d'entretien du :
 - o Cancer de l'ovaire de haut grade
 - o Cancer des trompes de Fallope
 - o Cancer péritonéal primitif

Répondant aux critères suivants :

- 1) Récidivant, BRCA muté et sensible au platine
 - 2) En réponse (partielle ou complète) à une chimiothérapie à base de platine
- Posologie usuelle : 800 mg en deux prises par jour.
 - Dosage disponible : Gélule à 50 mg.
 - Modalités de prise : L'Olaparib doit être avalé entier, en dehors des repas (au moins 2h avant ou 1h après un repas) de préférence à la même heure.
 - Conditions de prescription et de délivrance :
 - o Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie
 - o Dispensation exclusivement dans les pharmacies hospitalières (*dispositif « AMM post ATU » dans l'attente d'une décision relative au remboursement*)

Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier les gélules. Ne pas ouvrir ou mâcher les gélules.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.



Alertes

- Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)
- [Interactions avec les médicaments substrats/inducteurs/inhibiteurs du CYP3A4](#)

Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
› Très fréquents		
Neutropénie, thrombopénie, anémie	- Hygiène générale. - NFP mensuelle. - Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements	- Alerter le médecin prescripteur référent en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.
Diarrhée	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement anti diarrhéique.
Nausées / vomissements	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement antiémétique
Toxicité neurologique céphalées, vertiges. Dysgueusie		- Prudence en cas de conduite de véhicule.
Fatigue	-Repos fréquent. - Exercices modérés (marche). Conserver une activité physique modérée (marche 30 min/jour) est recommandée.	
Pneumopathie (dyspnée, toux, fièvre)		Alerter le médecin prescripteur

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament