

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes  
Observatoire des Médicaments,  
des Dispositifs Médicaux  
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« PATIENT »

Palbociclib IBRANCE®



Notes personnelles

## Présentation et conditions de prescription

- Une présentation est disponible :
  - o Boite de 21 gélules dosées à 75, 100 ou 125 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et tenir hors de portée des enfants.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible uniquement dans les pharmacies des hôpitaux.

## Comment prendre ce médicament

- Le palbociclib se prend par voie orale en 1 prise par jour, au cours d'un repas pendant 21 jours, de préférence à la même heure, suivis de 7 jours sans traitement.

## Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laissez la gélule dans son emballage jusqu'au moment de la prise. Ne pas ouvrir les gélules.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Noter l'oubli.
- En cas d'apparition d'effets secondaires gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin oncologue référent. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement et le reprendra à dose adaptée.



## Alerte

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant tout le traitement et jusqu'à 3 semaines chez les femmes et 14 semaines chez les hommes après l'arrêt.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du traitement

## Gestion des principaux effets indésirables

	<b>PREVENTION</b>	<b>CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE</b>
<b>Très fréquents</b>		
<b>Fatigue</b>	Repos et pratiquer des exercices modérés (marche).	
<b>Saignements inhabituels Ecchymoses</b>	Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine.	Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (ex : nez, urine...).
<b>Fièvre, frissons</b>	Limiter le contact avec les personnes malades, lavez vous les mains fréquemment, désinfecter vos plaies.	Contactez votre médecin en cas de température > 38,5°C.
<b>Nausées, vomissements</b>	Essayer de boire souvent en petites quantités Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits ou épicés.	Prendre les antiémétiques prescrits. Appeler votre médecin en cas de vomissement malgré le traitement
<b>Ulcération de la bouche</b>	Maintenir une bonne hygiène buccale, utiliser une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas Utiliser les bains de bouche prescrits.	Contactez votre médecin si besoin
<b>Fréquents</b>		
<b>Eruption cutanée</b>	Eviter l'exposition au soleil et utilisation d'une protection solaire adaptée. Utiliser un savon doux et une crème émoulliente.	Contactez votre médecin.
<b>Chute de cheveux</b>	Possible, partielle	