

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Notes personnelles

Pazopanib VOTRIENT®



Présentation et conditions de prescription

- Boîte de 30 ou 60 comprimés à 200 ou 400 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

Comment prendre ce médicament

- Le pazopanib se prend en une prise par jour avec de l'eau et sans nourriture : 1 heure avant **ou** 2 heures après un repas.
- Les comprimés ne doivent pas être cassés, mâchés ou écrasés.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laisser les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, prenez la dose de pazopanib habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident.
- N'oublier pas de faire pratiquer les prises de sang prescrites.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez-vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.

Alertes

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus), le millepertuis au cours du traitement

Gestion des principaux effets indésirables

PREVENTION

CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE

► Fréquents

Diarrhée

Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.
Eviter le café, le lait, l'alcool.
Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).

Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour.
Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

Nausées/Vomissements

Essayer de boire souvent, par petites quantités
Faire des repas légers et fréquents en évitant les aliments gras, frits et épicés.

Prendre les antiémétiques prescrits. Appeler votre médecin, en cas de vomissements malgré le traitement.

Picotement, gonflement, rougeur, douleur de la paume des mains et de la plante des pieds

Utiliser un savon doux.
Appliquer souvent une crème hydratante sur vos pieds et vos mains.
Eviter l'exposition au soleil (écran total) et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains (jardinage, bricolage, bijoux serrés).
Porter des chaussures amples,

En cas de gêne, de douleurs ou si vos activités sont affectées, contacter votre médecin.

Modification de la couleur des cheveux, dépigmentation de la peau

Hypertension

Effectuer une mesure régulière de votre tension artérielle (auto-mesure ou mesure par un professionnel de santé).

Contactez le médecin si la tension augmente.

Palpitations cardiaques, douleur thoracique

Prévenir immédiatement votre médecin.