

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)



OMÉDIT Rhône-Alpes

Observatoire des Médicaments,
des Dispositifs Médicaux
et des Innovations Thérapeutiques

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« PATIENT »

Ruxolitinib JAKAVI®



Notes personnelles

Présentation et conditions de prescription

- 56 comprimés dosés à 5mg, 15mg ou 20 mg.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.

Comment prendre ce médicament

- Le ruxolitinib se prend avec un verre d'eau, deux fois par jour, à intervalle de 12h, de préférence chaque jour à la même heure, pendant ou en dehors des repas. Les comprimés ne doivent pas être mâchés ou écrasés.
- Pour les moments de prise : choisir des moments qui vous permettront de ne pas oublier le médicament.

Conseils généraux

- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.
- Laisser les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation de comprimé.
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, prenez la dose suivante habituellement prescrite (sans doubler celle-ci). Notez l'incident.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident.
- N'oubliez pas de faire pratiquer les prises de sang éventuellement prescrites.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez vous en rapport avec votre médecin. Celui-ci pourra vous demander d'arrêter votre traitement ou de le poursuivre à dose adaptée.

Alerte

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement.
- Ne pas prendre ce traitement au cours de l'allaitement.
- Eviter le pamplemousse (fruit et jus) ou le millepertuis au cours du traitement.

Gestion des principaux effets indésirables

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Saignements de nez, crachats de sang, sang dans les urines Ecchymoses	Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine.	Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (ex : nez, urine...).
Fièvre, frisson	Limites les contacts avec les personnes malades. Lavez-vous les mains fréquemment Désinfectez vos plaies	Contactez votre médecin en cas de température > 38,5°C.
Etourdissements, vertiges	Repos et exercices modérés (marche). Ayez une bonne hygiène de vie. Ne pas boire d'alcool ;	Prudence si vous devez conduire.
Céphalées		Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1gramme par prise, maximum 4 fois par jour). Contactez votre médecin si les symptômes persistent.