

Contacts  
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION  
SUR LES MÉDICAMENTS  
« PROFESSIONNELS DE SANTÉ »

Topotécan HYCAMTIN®



Notes personnelles

## Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le topotécan est un médicament cytotoxique, inhibiteur de la topoisomérase I.
- Indications 2016 :
  - ✓ Cancer bronchique à petites cellules chez les patients en rechute, en monothérapie.
- Posologie usuelle : 2,3 mg/m<sup>2</sup>/jour en une prise, pendant 5 jours tous les 21 jours.
- Dosages disponibles : Gélules à 0,25 mg et 1 mg.
- Modalités de prise : Le topotécan doit être avalé entier (ni écrasé, ni mâché, ni ouvert) avec un verre d'eau, au cours ou en dehors d'un repas, de préférence à la même heure.
- Conditions de prescription et de délivrance :
  - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie
  - Dispensation dans les pharmacies de ville (conservation entre +2°C et +8°C - prévoir un sac isotherme pour le transport - et à l'abri de la lumière - plaquettes à conserver dans la boîte-)

## Conseils généraux

- Ne pas déconditionner, ni stocker les gélules dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose suivante à l'heure habituelle sans augmenter celle-ci.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.



## Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)

## Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
<b>Fréquents</b>		
<b>Toxicité hématologique dose-dépendante, non cumulative</b>	Hygiène générale. NFP hebdomadaire (Nadir J9-J16 sévère dans 20%).	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.
<b>Neutropénie</b>	Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements	
<b>Thrombopénie</b>		
<b>Anémie</b>		
<b>Diarrhée</b>	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement anti diarrhéique.
<b>Nausées / vomissements</b>	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer le traitement antiémétique
<b>Ulcération de la bouche</b>	Rappel au patient d'avoir une bonne hygiène buccale, utilisation d'une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas et qu'il évite les aliments acides, épicés et irritants.	Prescription de bains de bouche au bicarbonate, sans alcool. Alerter le médecin si présence d'ulcérations ou d'une bouche douloureuse.
<b>Trouble neurologique (fatigue ou faiblesse, céphalées, vertiges...)</b>	Repos fréquent. Exercices modérés (marche). Conserver une activité physique modérée (marche 30 min/jour) est recommandée.	
<b>Alopécie</b>	Réversible à l'arrêt du traitement.	
<b>Peu fréquents</b>		
<b>Hypersensibilité</b>	Réaction anaphylactique très rare.	
<b>Rash, urticaire</b>		
<b>Toxicité hépatique</b>	Réversible à l'arrêt du traitement.	Surveillance bilan hépatique.
<b>Hyperbilirubinémie</b>		

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament