

Contacts
(Médecin, Pharmacien, ...)

FICHE D'INFORMATION
SUR LES MÉDICAMENTS
« **PROFESSIONNELS DE SANTÉ** »

Témozolomide
TEMODAL® & Génériques



Notes personnelles



Type de produit, indications et conditions de prescription

- Le témozolomide est un médicament cytotoxique de la famille alkylants.
- Indications 2016 :
 - ✓ Gliomes malins (glioblastomes multiformes ou astrocytomes anaplasiques) en récurrence ou en progression après un traitement standard y compris chez l'enfant à partir de 3 ans.
 - ✓ Glioblastomes multiformes nouvellement diagnostiqués en association à la radiothérapie puis en monothérapie
- Posologies usuelles :
 - Patient en rechute :
 - Patient non-prétraité par chimiothérapie : 200mg/m² en une prise par jour pendant 5 jours tous les 28 jours
 - Patient prétraité par chimiothérapie : 150 mg/m²/ en une prise par jour pendant 5 jours tous les 28 jours (200mg/m² à partir du cycle 2 si bonne tolérance)
 - Patient nouvellement diagnostiqué : en association à la radiothérapie, 75 mg/m² en une prise par jour pendant 42 jours. Puis, 4 semaines après la fin de la radiothérapie, reprise selon le schéma des patients prétraités par chimiothérapie.
- Dosages disponibles : Gélules à 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, et 250 mg (princeps et génériques)
- Modalités de prise : Le témozolomide doit être avalé entier (ni écrasé, ni mâché, ni ouvert) avec un verre d'eau, à jeun (à distance d'au moins une heure d'un repas) de préférence à la même heure. Prendre l'antiémétique 30 minutes avant TEMODAL. En cas de radiothérapie, prendre le témozolomide 1h avant.
- Conditions de prescription et de délivrance :
 - Prescription réservée aux médecins spécialistes en oncologie ou hématologie
 - Dispensation exclusivement dans les pharmacies hospitalières.

Conseils généraux



- Ne pas déconditionner, ni stocker les gélules dans un pilulier.
- En cas d'oubli d'une prise, prendre la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le soir ou le jour suivant. Noter l'oubli.
- En cas de vomissements, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la suivante. Noter l'incident.

Alertes

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement et 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson)

Gestion des principaux effets indésirables

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fréquents		
Neutropénie, thrombopénie, anémie	- Hygiène générale. - NFP mensuelle. - Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements	- Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38°C qui décidera de la conduite à tenir.
Diarrhée	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements anti-diarrhéiques
Nausées / vomissements	Eviter les aliments épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Réévaluer les traitements et/ou antiémétiques.
Eruption cutanée, rash, prurit, syndrome de Lyell	Arrêt du traitement en cas d'éruption grave.	Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement.
Alopécie		Démangeaisons peuvent être traitées par antihistaminique oral et/ou corticoïdes.
Toxicité neurologique Fatigue, Céphalées...	-Conserver une activité physique modérée (marche 30 min) est recommandée.	Prudence en cas de conduite de véhicule.
Exceptionnels		
Pneumopathie interstitielle Pneumopathie à pneumocystis carinii	Rare. En cas de radiothérapie concomitante : prophylaxie par BACTRIM FORT® (1 cp 3 fois / semaine) ou PENTACARINAT® (1 aérosol / mois).	Contactez rapidement le médecin prescripteur.

Pour plus d'information, consulter le RCP du médicament