

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter : le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après ; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Protégez-vous des rayons du soleil : évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.
- Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur prévenir l'équipe médicale.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin. Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies : hydratation, anti-allergiques, anti-nauséeux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole ALIMTA

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole ALIMTA®

Ce protocole comprend l'administration d'un médicament :
ALIMTA® (pemetrexed)

Cette cure sera répétée tous les 21 jours.
Ce médicament sera administré en perfusion intraveineuse
pendant 30 minutes environ.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **ALIMTA**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nausées et vomissements. • Manque d'appétit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement, et fractionner les repas. Eviter les aliments gras, frits et épicés. • Prendre plusieurs petites collations par jour, manger lentement, boire beaucoup. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si les vomissements ont lieu moins de 1 heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constipation. • Mucite, stomatite : aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres. • Diarrhées. • Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, liés à la baisse du nombre de globules blancs dans le sang. • Réactions allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, malaise, rougeurs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation riche en fibres, boire beaucoup d'eau; pratiquer quelques exercices légers. • Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple et éviter les dentifrices mentholés. Eviter les aliments trop chauds, épicés, acides, l'alcool et le tabac. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. • Administration de médicaments anti-allergiques avant la perfusion. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contacter votre médecin ou votre pharmacien. • Faire systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie). • Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38 °C; un bilan sanguin sera effectué, et éventuellement une prescription d'antibiotiques; une hospitalisation pourra être nécessaire. • Consulter immédiatement l'équipe médicale.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.