

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Si vous fumez, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider à arrêter: le tabac peut aggraver des petites ulcérations buccales, ce qui sera douloureux et source éventuelle d'infections.
- Évitez de boire de l'alcool, le jour du traitement et quelques jours après; l'alcool peut également aggraver des ulcérations buccales.
- Protégez-vous des rayons du soleil: évitez de vous exposer, utilisez un écran total.
- Les médicaments sont éliminés pendant plusieurs jours dans les urines et les selles. Il est important de bien nettoyer les toilettes après utilisation.
- Surveillez régulièrement la zone cutanée autour de votre chambre implantable. En cas de gêne, picotement, brûlure, rougeur prévenir l'équipe médicale.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin. Pendant votre traitement, certains médicaments vous seront administrés pour éviter les effets secondaires liés aux chimiothérapies: hydratation, anti-allergiques, anti-nauséux. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec les médicaments de chimiothérapie.

● AUTRES REMARQUES

- Contactez votre médecin en cas de modification du goût ou de fatigue excessive.
- Indiquez-lui si vous souffrez de zona, de goutte, de calculs rénaux, de troubles du foie ou des reins, d'atteinte neurologique.

Protocole FOLFIRI-VECTIBIX

Vous allez suivre un traitement par chimiothérapie selon le protocole FOLFIRI-VECTIBIX

Ce protocole comprend l'administration de 3 médicaments:
5 - Fluorouracile associé à l'acide folinique
CAMPTO® (Irinotecan)
VECTIBIX® (Panitumumab)

Cette cure sera répétée tous les 15 jours.

La durée moyenne de l'administration à l'hôpital sera d'environ 4 heures et sera suivie d'une perfusion continue à domicile par l'intermédiaire d'un dispositif portable sur 48 heures.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.

Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES EVENTUELS ?

Protocole **FOLFIRI-VECTIBIX**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
Fréquents <ul style="list-style-type: none">• Réactions cutanées : acné, rash, érythème, prurit, sécheresse cutanée.• Mucite, stomatite : aphtes, ulcérations dans la bouche ou sur les lèvres.• Sécheresse de la peau et rougeur des mains, des pieds. Douleurs dans les mains ou les pieds (syndrome pied-main).• Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, liés à la diminution des globules blancs dans le sang.• Altération des ongles (infection du lit de l'ongle, décollement).• Douleurs abdominales, diarrhées.• Nausées et vomissements.	<ul style="list-style-type: none">• Se protéger du soleil : ne pas s'exposer et utiliser un écran total. Un traitement préventif associant soins locaux et antibiotiques est généralement prescrit.• Se brosser régulièrement les dents avec une brosse à dents souple, éviter les dentifrices mentholés. Éviter les aliments trop chauds, acides, épicés ainsi que l'alcool et le tabac.• Éviter toute exposition des mains et des pieds à la chaleur, toute compression des extrémités (gants, chaussures trop serrées). Utiliser un savon doux et d'une crème hydratante neutre sans parfum.• Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains.• Se couper les ongles courts afin qu'ils ne se fissurent ou se soulèvent. Consulter un podologue pour des soins préventifs.• Limiter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boissons contenant de la caféine.• Prendre les médicaments prescrits, manger lentement et fractionner les repas.	<ul style="list-style-type: none">• En parler à votre médecin. L'acné est généralement réversible à l'arrêt du traitement.• Faire systématiquement les bains de bouche prescrits (BICARBONATE seul, sans adjonction d'autres produits). Si les ulcérations s'aggravent, prévenir le médecin qui pourra prescrire un traitement adapté (séances de laser basse énergie).• En parler à votre médecin ou l'infirmière.• Contrôler votre température et prévenir immédiatement votre médecin si elle est supérieure à 38° C. Un bilan sanguin et éventuellement une prescription d'antibiotiques seront effectués. Une hospitalisation pourra être nécessaire.• Prévenir le médecin en cas d'infection.• Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin.• Si les vomissements ont lieu moins de 1 heure avant la prise (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, contacter votre médecin.
Moins fréquents <ul style="list-style-type: none">• Hypersudation, crampes abdominales, larmoiements, conjonctivite, hypersalivation, troubles de l'accommodation visuelle, diarrhées immédiates et profuses, dit syndrome cholinergique.• Manque d'appétit.• Alopecie (chute de cheveux).• Tachycardie : pulsations cardiaques accélérées, essoufflement.	<ul style="list-style-type: none">• Ces effets peuvent survenir très rapidement après la perfusion mais sont habituellement prévenus par l'injection d'un médicament adapté (Atropine).• Prendre plusieurs petites collations par jour, manger lentement et boire beaucoup.• Pas de soins agressifs type teinture ou permanente.	<ul style="list-style-type: none">• Privilégier les aliments à fort pouvoir calorique. Demander les conseils d'une diététicienne.• Une perruque ou prothèse capillaire pourra être prescrite. Les cheveux repousseront après l'arrêt du traitement.• Prévenir rapidement le médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.