

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Une surveillance du bilan sanguin sera effectuée régulièrement afin de suivre la tolérance et l'efficacité du traitement.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie : si vous consommez du tabac, parlez-en à votre médecin, il pourra vous aider à arrêter.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance sans en parler avec votre médecin.

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement (par exemple les antiacides utilisés en cas de brûlure d'estomac). Demandez conseil à votre pharmacien.

Certaines plantes ou tisanes peuvent interagir avec votre traitement, demandez conseil à votre pharmacien.

● AUTRES REMARQUES

En cas d'oubli de prise : Ne pas prendre la dose oubliée, attendre la prochaine prise sans la doubler. Noter l'oubli.

En cas de vomissement après la prise d'Imatinib : Ne pas reprendre la dose. Attendre la prise suivante et ne pas doubler la dose. Noter l'incident.

Protocole GLIVEC (IMATINIB)

Vous allez suivre un traitement par Imatinib

Ce médicament sera pris par voie orale,
pendant le repas et à heure fixe :

1 fois par jour pour les doses de 400 à 600 mg par jour
2 fois par jour pour les doses de 800 mg par jour (matin et soir)

Les comprimés doivent être avalés entiers sans les croquer.

Il est possible de les disperser dans un verre d'eau plate
ou de jus de pomme en cas de difficultés pour avaler.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **GLIVEC (IMATINIB)**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhées. • Nausées, vomissements. • Rash cutané, photosensibilisation. • Neutropénie, thrombopénie, anémie. • Œdèmes superficiels (périorbitaires et membres inférieurs), prise de poids. • Crampes musculaires. • Céphalées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. Boire beaucoup d'eau (au moins 2L/jour). • Fractionner les repas, boire beaucoup d'eau. • Eviter toute exposition au soleil, utiliser un écran total. Utiliser un savon doux et une crème hydratante. • Surveillance régulière de la NFS. • Surveillance régulière du poids. • Hydratation, éviter les mouvements répétitifs. • Repos fréquent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Traitement anti-diarrhéique symptomatique. Alerter le médecin en cas de diarrhées persistantes. • Traitement symptomatique à visée antiémétique. • Contacter le médecin en cas de gêne ou de lésions trop importantes. • Contacter le médecin en cas de fièvre supérieure à 38°C ou devant tout signe infectieux. • En parler au médecin. • En parler au médecin. • En parler au médecin.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toxicité neurologique (vertiges, troubles du goût, insomnies). • Affections oculaires (conjonctivite, vision trouble...). 	<ul style="list-style-type: none"> • Repos fréquent. 	<ul style="list-style-type: none"> • En parler au médecin. • En parler au médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.