

Recommandations générales

● GROSSESSE - ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement.

● AUTRES REMARQUES

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous oubliez une prise, ne doublez pas la dose suivante. Poursuivez le traitement normalement et informez-en votre médecin.

Protocole INLYTA

Vous allez suivre un traitement par thérapie ciblée selon le protocole INLYTA® (Axitinib).

Ce médicament sera pris par voie orale 2 fois par jour, au cours ou en dehors des repas à 12h d'intervalle, de préférence à la même heure chaque jour.



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

| FRÉQUENCE | PRÉVENTION | QUE FAIRE ? |
|---|--|---|
| <p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diarrhées. • Nausées et vomissements. • Hypertension artérielle, céphalées (maux de tête), palpitations, bourdonnements d'oreilles. • Sècheresse cutanée, rougeur des mains et des pieds. • Fatigue. • Diminution de l'appétit, perte de poids. • Trouble de la voix. | <ul style="list-style-type: none"> • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boissons contenant de la caféine. • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. • A l'instauration de votre traitement, suivre votre tension à domicile à l'aide d'un tensiomètre 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Faire de l'exercice, contrôler votre poids. Limiter la consommation de sel et d'alcool. • Eviter de rester trop longtemps debout, de porter des chaussures serrées. Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum. • Maintenir une activité physique (marche/bicyclette), faire des exercices de relaxation, et des siestes de courte durée. • Prendre plusieurs petites collations dans la journée, manger lentement, et boire beaucoup. | <ul style="list-style-type: none"> • Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • Si les vomissements ont lieu moins de une heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Contacter votre médecin si ces signes surviennent. Si besoin, il pourra prescrire un médicament antihypertenseur. • En parler au médecin ou à l'infirmière. • En parler à votre médecin. • En parler à votre médecin. Une diététicienne pourra vous accompagner. • En parler à votre médecin. |
| <p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risques de saignements. | | <ul style="list-style-type: none"> • Alerter votre médecin. |

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.