

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci. Avant votre traitement, votre médecin vous prescrira un bilan cardiaque.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Lavez-vous les mains régulièrement, surtout avant chaque repas pour limiter les risques d'infections.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement.

● AUTRES REMARQUES

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Protocole KADCYLA

Vous allez suivre un traitement de chimiothérapie selon le protocole KADCYLA® (Trastuzumab Emtansine)

L'administration se fera
sur une durée d' 1h30 lors de la 1^{re} administration
puis en 30 minutes, si le traitement est bien toléré.
Les perfusions ont lieu toutes les 3 semaines.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **KADCYLA**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fatigue. • Signes d'infections : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang. • Risques allergiques : fièvre, frissons, démangeaisons, baisse de tension. • Pulsations cardiaques accélérées ou irrégulières, essoufflement, gonflement des pieds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maintenir une activité physique (marche/bicyclette), faire des exercices de relaxation, et des siestes de courte durée. • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. • Vous serez surveillé pendant et après la perfusion. • Evaluation de la fonction cardiaque par échographie avant le début du traitement puis tous les 3 mois 	<ul style="list-style-type: none"> • En parler à votre médecin. • Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C ; un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. Une hospitalisation pourra être nécessaire. • Des médicaments anti-allergiques pourront être prescrits avant les perfusions. • Prévenir le médecin, des examens cardiaques peuvent être nécessaires.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pneumopathies : toux, essoufflement, difficulté à respirer. • Perturbation hépatique, essentiellement sur le bilan biologique. • Troubles digestifs, diarrhée, nausées. 		<ul style="list-style-type: none"> • Prévenir immédiatement l'équipe médicale. • Montrer le bilan au médecin oncologue qui vous suit. • En parler à votre médecin, des traitements symptomatiques vous seront prescrits.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.