

Recommandations générales

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

LENVIMA est susceptible de perturber vos bilans hépatique, rénal et thyroïdien. Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie : si vous consommez du tabac, parlez-en à votre médecin, il pourra vous aider à arrêter.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance sans en parler à votre médecin.

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement (par exemple les antiacides utilisés en cas de brûlures d'estomac). Demandez conseil à votre pharmacien.

Certaines plantes ou tisanes peuvent interagir avec votre traitement, demandez conseil à votre pharmacien.

● AUTRES REMARQUES

En cas d'oubli de prise, ne pas prendre la dose oubliée, la dose suivante sera prise le lendemain à l'heure habituelle, sans doubler la dose. Noter l'oubli.

En cas de vomissement après la prise de LENVIMA : ne pas reprendre la dose. Attendre la prise suivante et ne pas doubler la dose.

Protocole LENVIMA

Vous allez suivre un traitement par LENVIMA® (Lenvatinib)

Ce médicament sera pris par voie orale, pendant ou en dehors du repas, une fois par jour à heure fixe.

Les gélules doivent être avalées entières (ne pas les ouvrir, les mâcher ou les broyer).



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES EVENTUELS ?

Protocole **LENVIMA**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
Fréquents <ul style="list-style-type: none">• Hypertension artérielle, maux de tête, bourdonnements d'oreilles, vertiges.• Diarrhées.• Nausées, vomissements, perte d'appétit, troubles du goût.• Troubles hématologiques, risque d'infection, fièvre.• Fatigue, céphalées.• Syndrome main-pied : sécheresse de la peau et rougeur des mains et des pieds. Douleurs dans les mains et les pieds.	<ul style="list-style-type: none">• Suivre votre tension à domicile à l'aide d'un tensiomètre. Faire de l'exercice, contrôler votre poids. Limiter la consommation de sel et d'alcool. Un bilan cardiaque sera effectué à l'instauration du traitement, et un suivi régulier sera assuré par l'équipe soignante.• Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de caféine, lait, fruits, légumes crus, céréales. Privilégier les féculents, carottes, bananes... Prendre les médicaments anti-diarrhéiques prescrits par le médecin.• Manger lentement et fractionner les repas (manger des petites quantités mais plus souvent). Des antiémétiques pourront être prescrits par le médecin.• Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits.• Anticiper les moments de fatigue et prévoir des moments de repos. Se fixer des priorités.• Eviter de rester trop longtemps debout, de porter des chaussures serrées. Utiliser un savon doux et une crème hydratante neutre sans parfum.	<ul style="list-style-type: none">• Consulter votre médecin si ces signes surviennent. Si besoin, il pourra prescrire un médicament antihypertenseur.• Boire beaucoup d'eau (2L par jour). Si les diarrhées persistent plus de 48h, prévenir le médecin.• Si les vomissements se produisent moins d'une heure après la prise des comprimés, vous pouvez prendre une nouvelle dose (sauf Lyoc). Si les vomissements persistent prévenir le médecin.• Prendre votre température régulièrement, contacter le médecin en cas de signes infectieux (fièvre supérieure à 38°C, frissons ou sueurs, toux...).• En parler au médecin.• En parler au médecin ou à l'infirmière. Les soins de pédicurie sont autorisés.
Moins fréquents <ul style="list-style-type: none">• Saignements de nez.		<ul style="list-style-type: none">• En parler au médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.