

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins (foie, thyroïde, rein) destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIENE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux :

- Lavez-vous régulièrement les mains surtout avant les repas pour limiter les risques d'infection.
- Une diminution de l'appétit peut survenir. Mangez plus souvent et en petite quantité.

● MEDICAMENTS ASSOCIES

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement.

● AUTRES REMARQUES

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Protocole OPDIVO

Vous allez suivre un traitement par immunothérapie selon le protocole OPDIVO®

Ce médicament sera administré
en perfusion intraveineuse toutes les 2 semaines
pendant 1h.



Ce document a été élaboré par
le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique.
Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.
Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser
et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **OPDIVO**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<ul style="list-style-type: none"> • Diarrhées, douleurs abdominales, présence de sang dans les selles. • Toux, difficultés respiratoires. • Nausées et vomissements. • Réactions allergiques lors de la perfusion. • Fatigue. • Diminution de l'appétit. • Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang. • Eruptions cutanées, démangeaisons, peau sèche. • Diminution de l'activité de la thyroïde : fatigue importante, prise de poids. • Douleurs musculaires et articulaires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements ; manger lentement et fractionner les repas. • Une surveillance sera réalisée lors de la perfusion. • Maintenir une activité physique (marche/bicyclette), faire des exercices de relaxation et des siestes de courte durée. • Prendre plusieurs petites collations dans la journée, manger lentement et boire beaucoup. • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. • Un contrôle sanguin de votre thyroïde sera réalisé pendant la durée du traitement. Surveiller votre poids. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez plus de 4 à 6 selles par jour, prévenir rapidement votre médecin car un traitement par corticoïdes sera peut être nécessaire. • Prévenir rapidement votre médecin car des examens radiologiques pourront être effectués. • Si les vomissements ont lieu moins de une heure après la prise des comprimés renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Un traitement anti-allergique pourra être prescrit. • En parler à votre médecin. • En parler à votre médecin. Une diététicienne pourra vous accompagner. • Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C ; un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. • En parler au médecin. • En parler au médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.