

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

Le pamplemousse doit être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec votre traitement. Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides et antisécrétoires). En cas de besoin, ces médicaments doivent être pris à distance du TARCEVA® (4h avant ou 2h après la prise). Demandez conseil à votre pharmacien.

● AUTRES REMARQUES

Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de Tarceva®, ne prenez pas la dose oubliée et ne doublez pas la dose suivante. Prenez la dose habituellement prescrite le jour suivant et signalez-le à votre médecin.

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Protocole TARCEVA

Vous allez suivre un traitement par thérapie ciblée selon le protocole TARCEVA® (Erlotinib)

Ce médicament sera pris par voie orale une fois par jour, à heure fixe, tous les jours, de préférence le matin, à distance des repas.

Les comprimés doivent être pris au moins 1h avant ou 2h après un repas.



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

Protocole **TARCEVA**

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sècheresse cutanée, démangeaisons, éruptions cutanées. Acné. • Affections oculaires : kératites, conjonctivites. • Nausées et vomissements. • Diarrhée. • Difficulté à respirer, toux. • Fatigue inhabituelle, maux de tête. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser un savon doux et une crème émolliente tous les jours. Eviter les expositions au soleil, utiliser un écran total. Une prescription d'antibiotique pourra être réalisée. • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. • Eviter les contacts avec des personnes malades. • Veiller à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement). Vous reposer souvent. Des exercices légers (marche) peuvent être utiles. 	<ul style="list-style-type: none"> • En parler à votre médecin. L'apparition d'acné et l'éruption cutanée peuvent être prédictives de l'efficacité du traitement. En cas d'aggravation d'une lésion cutanée, prévenir rapidement votre médecin. • En parler à votre médecin ou à votre ophtalmologiste. • Si les vomissements ont lieu moins de une heure après la prise des comprimés (sauf Lyoc), renouveler la prise. Si les vomissements persistent, prévenir le médecin. • Boire beaucoup d'eau. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • Prévenir rapidement votre médecin. • Prudence en cas de conduite d'un véhicule.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chute modérée des cheveux. • Affections oculaires : ulcérations de la cornée, allongement des cils. 		<ul style="list-style-type: none"> • En parler à votre médecin ou à votre ophtalmologiste.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.