

Recommandations générales

● GROSSESSE – ALLAITEMENT

Avant tout traitement, prévenez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Une méthode contraceptive efficace doit être instaurée.

● VACCINATIONS

Les vaccinations peuvent être possibles dans certains cas. Parlez-en à votre médecin.

● BILANS SANGUINS

Des perturbations de vos bilans hépatique et hématologique peuvent survenir. Une surveillance particulière sera effectuée et des bilans sanguins destinés à suivre la tolérance et l'efficacité de votre traitement seront réalisés avant et au cours de celui-ci.

● HYGIÈNE DE VIE

Il est important de respecter une bonne hygiène de vie au cours d'un traitement anti-cancéreux.

● MÉDICAMENTS ASSOCIÉS

Ne prenez pas de médicament, même délivré sans ordonnance (comme l'aspirine ou le paracétamol) sans en parler avec votre médecin.

XALKORI® est susceptible d'engendrer des perturbations cardiaques. Une surveillance rapprochée sera effectuée par l'équipe médicale. Informez votre médecin des traitements que vous prenez habituellement car certains peuvent interagir avec le Crizotinib. Le pamplemousse doit également être évité sous toutes ses formes (fruit, jus) ainsi que le Millepertuis ou herbe de la Saint Jean.

● AUTRES REMARQUES

Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**En cas d'oubli d'une prise de moins de 6 heures, prenez la dose de XALKORI.
En cas d'oubli d'une prise de plus de 6h, ne prenez pas la dose manquée.
Prenez la dose suivante à l'heure habituelle et signalez-le à votre médecin.**

Protocole XALKORI

Vous allez suivre un traitement par thérapie ciblée selon le protocole XALKORI® (Crizotinib)

Ce médicament sera pris par voie orale à raison d'une gélule de 250 mg deux fois par jour de préférence à la même heure chaque jour.

Il peut être pris pendant ou en dehors des repas.



Ce document a été élaboré par le **groupe pharmacien du réseau Oncauvergne** et validé par le conseil scientifique. **Ce document d'information n'a aucune valeur contractuelle.** Malgré le soin apporté à la rédaction de ces fiches, une erreur ou une coquille a pu s'y glisser et ne pourra pas être imputée aux auteurs.

Le réseau Oncauvergne, réseau régional de cancérologie en Auvergne a pour mission de favoriser l'homogénéité de la prise en charge des cancers dans la région en mettant à disposition des professionnels de santé des outils concernant les bonnes pratiques, la communication et la formation. Il doit également mettre en œuvre des actions d'information à destination du public.

FRÉQUENCE	PRÉVENTION	QUE FAIRE ?
<p>Fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Troubles de la vision, vision double, floue. • Nausées, vomissements, perte d'appétit. • Diarrhées. • Constipation. • Fatigue. • Œdèmes des bras et des jambes. • Troubles neurologiques, étourdissements, troubles du goût. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prendre les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements, manger lentement et fractionner les repas. Boire plutôt entre les repas. • Eviter les aliments épicés et frits. Limiter la consommation de boisson contenant de la caféine. • Privilégier une alimentation riche en fibres, boire beaucoup d'eau. Pratiquer quelques exercices légers. • Respecter une bonne hygiène de vie, maintenir une activité physique (marche/bicyclette), faire des exercices de relaxation, et des siestes de courte durée. • Elever vos pieds quand vous êtes assis. Maintenir une alimentation à faible teneur en sel. Eviter le port de vêtements trop serrés. Surveiller votre poids. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prévenir votre médecin. Un examen ophtalmologique sera envisagé en cas de persistance ou d'aggravation des symptômes. Soyez vigilant si vous utilisez des machines ou conduisez un véhicule. • Prévenir votre médecin si les signes persistent. • Boire beaucoup d'eau. Suivre de façon stricte la prescription médicale antidiarrhéique. Si les diarrhées persistent plus de 48 heures, prévenir le médecin. • En cas de constipation prolongée, prévenir votre médecin. • En cas de fatigue persistante, en parler à votre médecin. • En cas de prise de poids rapide, prévenir votre médecin. • Prévenir votre médecin. Prudence si vous utilisez des machines ou conduisez un véhicule.
<p>Moins fréquents</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toxicité hématologique, signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge liés à la baisse de globules blancs dans le sang. • Difficultés respiratoires, essoufflement, douleurs thoraciques, toux. • Troubles cardiaques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limiter les contacts avec les personnes malades ou enrhumées. Se laver souvent les mains. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter rapidement votre médecin en cas de fièvre, toux. Contrôler votre température et prévenir le médecin si elle est supérieure à 38°C, un bilan sanguin sera effectué et éventuellement une prescription d'antibiotiques. • Consulter votre médecin. • Votre fonction cardiaque sera régulièrement contrôlée par votre médecin.

Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.