



# SoFOG

SOCIÉTÉ FRANCOPHONE  
D'ONCO-GÉRIATRIE



**Recommandations de la SoFOG en  
termes de vaccination contre le  
SARS-CoV-2 chez les patients âgés  
traités pour un cancer**

Depuis le 18 janvier 2021, les patients âgés de 75 ans et plus ainsi que les patients traités pour un cancer ou une hémopathie maligne de moins de 3 ans et en particulier en cours de chimiothérapie sont deux populations prioritaires pour la vaccination contre le SARS-CoV-2.

C'est pourquoi la Société Francophone d'OncoGériatrie (SoFOG) recommande aux médecins en charge de cette population de proposer la vaccination contre la COVID-19, en l'absence de contre-indications définitives ou temporaires :

- épisode infectieux en cours
- épisode infectieux à la COVID-19 inférieur à 3 mois
- allergie à un composant du vaccin
- avis d'experts si poussée de maladie auto-immune ou anaphylaxie à un autre vaccin ou de cause inconnue
- vaccination antigrippale de moins de 3 semaines.

Ces recommandations font suite à celles émises par l'European Society for Medical Oncology (ESMO) du 22 décembre 2020 (*ESMO Statements for vaccination against COVID-19 in patients with cancer-décembre 2020*) et l'Institut National du Cancer (INCa) du 25 janvier 2021 (*INCa. Préconisations de priorisation des patients atteints de cancer pour la vaccination contre le SARS-CoV-2. Définition des patients ultra-prioritaires. 25 janvier 2021*).

Traitements oncologiques	Chimiothérapie/thérapie ciblée	Immunothérapie	Médicaments agissant sur les cellules B (anti-CD19, anti-CD20, CAR-T cells)
<p><b>Recommandations</b></p>	<p><b>Si initiation</b> : vacciner au moins 10 jours avant la première cure de chimiothérapie, si possible</p> <p><b>Si chimiothérapie en cours</b> : éviter de réaliser le vaccin le jour de l'administration de la chimiothérapie (risque de réduire l'effet du vaccin) mais plutôt de le réaliser entre 2 cures, en évitant la période d'aplasie</p>	<p>Les recommandations sont similaires à celles sous chimiothérapie sauf en cas d'effet secondaire auto-immun sévère qui fera différer la vaccination en attendant l'avis d'un expert</p>	<p>Le vaccin devra être fait avant de débuter ce traitement ou 6 mois après la fin du traitement (risque de moindre efficacité du vaccin)</p>

**Pour protéger d'autant plus la population âgée atteinte de cancer de l'infection à SARS-CoV-2, il est recommandé de vacciner également l'entourage proche de ces patients.**