

Description de l'évolution de la qualité de vie et d'autres facteurs des patientes présentant un cancer du sein



Karen T. REILLY, Alexandre FONCELLE, Marie GRIGNON, Sophie JACQUIN-COURTOIS

CONTEXTE

- Cancer du sein: > 1 million de cas par an
- Effets secondaires parfois sévères après chimiothérapie / radiothérapie / hormonothérapie



Importantes modifications du mode de vie

OBJECTIF :









Décrire l'évolution de la qualité de vie et d'autres facteurs associés au cours du parcours de soins

POPULATION 1 (Etude SPENCER)

- Patientes suivies dès leur diagnostic et pendant les traitements adjuvants (hors hormonothérapie)
- Trois temps d'évaluation
 1. avant la chirurgie
 2. avant la radiothérapie
 3. après la radiothérapie

POPULATION 2 (Programme ALIZES)

- Patientes qui participaient à un programme multidisciplinaire de 12 semaines (activité physique, kinésithérapie et psychomotricité),
- ≈ 5 mois après la fin de la radiothérapie
- Deux temps d'évaluation
 1. avant le programme
 2. après le programme



EVOLUTION

Pendant les traitements adjuvants

- peu de patientes avec troubles anxieux et dépressifs ou plaintes cognitives
- niveau de fatigue léger et qualité de vie satisfaisante

Après phase initiale de traitements actifs

- ≈ 50% des patientes avec anxiété élevée
- niveau de plainte cognitive important
- qualité de vie plus faible qu'à la fin des traitements actifs

Après programme multidisciplinaire

- Evolution favorable
 - anxiété
 - qualité de vie
 - plainte cognitive
 - fatigue

L'efficience cognitive a peu varié tout au long du parcours de soin