

QUELS SONT LES CRITÈRES D'EXCLUSION DU TEST ?

EN CAS DE SYMPTÔMES ÉVOCATEURS D'UN CANCER COLORECTAL

- Présence de sang (rouge ou noir) dans les selles.
- Douleurs abdominales d'apparition récente, persistantes ou inexpliquées, surtout après 50 ans.
- Troubles du transit récents et persistants, de cause inexpliquée, comme une diarrhée ou une constipation inhabituelle, ou une alternance de ces états, des coliques violentes, un syndrome rectal (faux besoins, ténésme, épreintes).
- Amaigrissement inexpliqué.
- Anémie ferriprive.

› Consultation chez un gastro-entérologue en vue d'une coloscopie

EN CAS DE RISQUE ÉLEVÉ

- ATCD personnel de cancer colorectal ou adénome.
- ATCD familial de cancer colorectal ou adénome de plus de 10 mm survenu chez 1 parent au 1^{er} degré < 65 ans ou chez au moins 2 parents au 1^{er} degré (quel que soit l'âge).
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin (rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn).

› Surveillance par coloscopie

EN CAS DE RISQUE TRÈS ÉLEVÉ (PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE)

- Polypose adénomateuse.
- Cancer colorectal héréditaire non polyposique (HNPCC, ou syndrome de Lynch).

› Surveillance par chromocoloscopie et suivi en consultation d'oncogénétique

SI LA PERSONNE A RÉALISÉ...

- Une coloscopie totale il y a moins de 5 ans.
- Un coloscanner seul ou une coloscopie incomplète suivi d'un coloscanner il y a moins de 2 ans.

LA COMMANDE DES KITS DE DÉPISTAGE

- **Simplement sur votre espace professionnel de santé de Ameli.fr, grâce à vos identifiants habituels pour recevoir des kits prérenseignés à vos coordonnées**
- **auprès de votre Centre régional de coordination des dépistages des cancers.**

POUR EN SAVOIR PLUS : e-cancer.fr

Afin de vous aider dans l'information, l'orientation et la prise en charge de vos patients, l'Institut national du cancer met à votre disposition des documents sur e-cancer.fr.

DOCUMENTS POUR VOTRE PRATIQUE

- Le diaporama de formation consultable en e-pdf sur e-cancer.fr utilisable pour vos FMC.

DOCUMENTS POUR VOS PATIENTS

- Le dépliant d'information sur le dépistage.
- Le mode d'emploi vidéo du test de dépistage.
- Le guide ALD patients « La prise en charge de votre cancer colorectal ».
- Le guide Cancer info « Les traitements du cancer du rectum ».



AUTORISÉ - Ne pas jeter sur la voie publique - INCa - SIREN : 187 512 777 - Juillet 2020 - OUTCCRIM20

CANCER COLORECTAL DÉPISTAGE PAR TEST IMMUNOLOGIQUE ET AUTRES MODALITÉS

Avec près de 43 000 nouveaux cas et 17 000 décès estimés en 2018, le cancer colorectal est le 3^e cancer le plus fréquent en termes d'incidence et le 2^e en termes de mortalité. Son pronostic reste médiocre. Pourtant, lorsqu'il est détecté à un stade précoce, il peut se guérir dans 90 % des cas.

Le **test immunologique** représente une **avancée significative pour le dépistage du cancer colorectal. Performant, fiable et simple**, ce test permet une détection précoce des cancers et l'identification des lésions précancéreuses.

VOTRE RÔLE, EN TANT QUE MÉDECIN TRAITANT, EST ESSENTIEL POUR :

- évaluer le niveau de risque de votre patient et lui proposer la modalité de dépistage adaptée ;
- l'inciter à réaliser le dépistage ;
- l'accompagner en cas de résultat positif.



À QUI REMETTRE LE TEST ET QUAND ?

- **À vos patients de 50 à 74 ans**, sans symptôme et sans antécédent personnel ou familial de cancer, d'adénome ou de maladie inflammatoire du côlon.
- **Lors d'une consultation**, qu'ils aient reçu ou non la lettre d'invitation du Centre régional de coordination des dépistages des cancers.

LES CARACTÉRISTIQUES DU TEST IMMUNOLOGIQUE

PERFORMANT

Au seuil de **150 ng Hb/ml de tampon** :
≈ **2,5 fois plus** de cancers détectés.

≈ **3,7 fois plus** d'adénomes avancés détectés.

Une **diminution de la mortalité** et même de l'**incidence** attendue.

≈ **2 fois moins** de faux négatifs.

FIABLE

Un test **spécifique de l'hémoglobine humaine**.

Une **lecture automatisée**, fiable et reproductible.

Un taux de positivité de **4 %**.

SIMPLE

1 seul prélèvement de selles.

1 test ergonomique et **rapide** d'utilisation.

LE KIT DE DÉPISTAGE

Il se présente en 3 volets contenant les éléments nécessaires à la réalisation du test.

- 1** – Le mode d'emploi.
- 2** – La fiche d'identification et le dispositif de recueil des selles.
- 3** – Le tube de prélèvement, le sachet de protection et l'enveloppe de retour.



POUR AIDER VOS PATIENTS À RÉALISER LE TEST, INVITEZ-LES À :

1 – BIEN REMPLIR LA FICHE D'IDENTIFICATION ET LE TUBE

pour permettre l'analyse du test et la transmission des résultats :

- coller les étiquettes préremplies présentes sur la lettre d'invitation ;
- renseigner la partie bleue de la fiche d'identification (si la personne n'a pas de lettre d'invitation).

La partie du milieu de la fiche est réservée à votre identification. Vérifiez votre identification, si elle est préremplie (commande sur amelipro.fr) Renseignez votre identification ou apposez votre tampon.

La partie du bas permet le suivi des résultats par un second professionnel de santé. À titre d'exemple, si un gastroentérologue remet un kit, il peut suggérer à son patient d'indiquer les coordonnées de son médecin traitant.

2 – RÉALISER UN PRÉLÈVEMENT EFFICACE

L'échantillon est prélevé à la surface des selles en la grattant à l'aide de la partie striée de la tige. Cette partie striée doit être recouverte de selles.

3 – ENVOYER LE TUBE DANS DE BONNES CONDITIONS

- Il doit être inséré dans le sachet de protection puis, avec la fiche d'identification, dans l'enveloppe de retour déjà affranchie.
- Le test doit être posté au plus tard 24 heures après sa réalisation. Il ne pourra être analysé que dans les 7 jours suivant le prélèvement. Conseillez à vos patients de ne pas poster le test la veille d'un week-end ou d'un jour férié compte tenu du délai d'analyse et afin qu'il ne reste pas exposé aux conditions climatiques dans la boîte aux lettres.



POUR AIDER LA PERSONNE DANS LA RÉALISATION DU TEST :

- un mode d'emploi papier est disponible dans le kit ;
- un tutoriel vidéo est consultable sur e-cancer.fr.

LES RÉSULTATS ET LE SUIVI DES TESTS POSITIFS

Les résultats vous sont adressés ainsi qu'au Centre régional de coordination des dépistages des cancers, dans un délai de 24 à 48 heures. Le laboratoire de biologie médicale vous propose de les recevoir par voie postale et également par voie dématérialisée (messagerie sécurisée, etc.). Les résultats sont également envoyés à votre patient par courrier dans les 15 jours ouvrés.

• **Dans 96% des cas, le résultat du test sera négatif** : vous pourrez proposer à nouveau le test dans 2 ans et inciter votre patient à consulter en cas de symptômes dans l'intervalle.

• **Dans 4% des cas, le résultat du test sera positif** : votre patient sera invité, par courrier, à vous consulter rapidement. Il devra être adressé à un gastro-entérologue pour une coloscopie de diagnostic ; celle-ci détectera un cancer dans 8% des cas et un adénome avancé pour 40% des cas. Si votre patient ne réalise pas de coloscopie, il sera relancé par courrier, 3 mois puis 6 mois après son résultat positif par le Centre régional de coordination des dépistages des cancers.

L'INFORMATION SUR LES ENJEUX DE CE DÉPISTAGE ET SUR SA FIABILITÉ

- 95% des cas de cancer colorectal surviennent après 50 ans. Il s'agit du 2^e cancer le plus meurtrier et du 3^e cancer le plus fréquent. Il touche les femmes et les hommes.
- Le test permet de repérer la présence d'un cancer, le plus souvent à un stade précoce, ou d'une lésion précancéreuse. Les traitements seront moins lourds et les chances de guérison plus importantes.
- Détecté tôt, un cancer colorectal peut se guérir dans 9 cas sur 10.
- Le test à faire chez soi est indolore, rapide et simple. Il ne nécessite qu'un seul prélèvement.
- La coloscopie n'est proposée et réalisée que suite à un test positif (4% des cas).
- Le test et son analyse sont pris en charge à 100% sans avance de frais.

Avec une sensibilité d'environ 70% et une spécificité de 96 à 98%, les risques de faux positifs et de faux négatifs, même s'ils existent, sont faibles. Ils sont de l'ordre de 0,15% pour les faux négatifs et de 4% pour les faux positifs (vis-à-vis des cancers).

LES RISQUES LIÉS À LA COLOSCOPIE

Cet examen peut entraîner des complications modérées à sévères pour 1 à 4,5% des coloscopies, dont des hémorragies (pour 1 à 3% des actes) et des perforations intestinales (pour 0,5 à 1% des actes). Les décès consécutifs aux complications surviennent pour 1/18000 à 1/10000 coloscopies.

Si la personne semble réticente au dépistage (méconnaissance du dépistage, ne se sent pas concernée, gêne à l'égard de la localisation, peur du résultat ou de la coloscopie), il est conseillé d'engager le dialogue pour :

- identifier la nature des freins et délivrer les informations lui permettant d'éclairer sa décision ;
- rappeler l'enjeu de ce dépistage et les qualités du test de dépistage (performance, simplicité, prélèvement unique).

9 PERSONNES SUR 10 EFFECTUENT LE TEST LORSQU'IL EST REMIS PAR LE MÉDECIN