FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE

Niraparib ZEJULA®

PATIENTS

A QUOI SERT ET COMMENT SE PRESENTE VOTRE MEDICAMENT ?

- **Indications :** Traitement de patientes adultes atteintes d'un cancer de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallopes ou péritonéal primitif.
- Boîte de 56 gélules ou 84 gélules de 100mg.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

- Laissez les gélules dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.

POINTS DE VIGILANCE

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt.

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

- Le Niraparib se prend une fois par jour, tous les jours (en continu), à la même heure, de préférence au coucher.
- Les gélules doivent être avalées entières (ne doivent pas être écrasées, ni mâchées) avec un verre d'eau au cours ou en dehors d'un repas.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Noter l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, chaque jour et sur toute sa durée.

GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez - vous en rapport avec votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra vous demander de diminuer la dose ou d'arrêter votre traitement, momentanément ou définitivement.

Effets indésirables qui peuvent survenir:	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Diminution des plaquettes de votre bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être réalisé une fois par semaine le 1er mois puis une fois par mois. Eviter l'aspirine, les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène…).	Contacter rapidement votre médecin si saignements inhabituels (nez, urine…).
Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin **Fièvre, frissons**	Les résultats du bilan sanguin doivent être communiqués à votre médecin. Reposez vous souvent. Limiter les contacts avec les personnes malades. Lavez vous les mains fréquemment. Désinfecter vos plaies.	Prenez votre température avant chaque prise. En présence de signes infectieux (température > 38°C, frissons, toux, brûlures urinaires), contacter le médecin.
Eruption cutanée, sécheresse cutanée, photosensibilité	Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émolliente. Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur.	
Dorsalgie, arthralgie, myalgie **Céphalées, sensations vertigineuses**	Repos et exercices modérés (marche). Ayez une bonne hygiène de vie. Ne pas boire d'alcool.	Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1g/prise ; maximum de 4 prises par jour) Prudence en cas de conduite de véhicule. Contacter votre médecin si les symptômes persistent.
Hypertension artérielle.	Effectuer une mesure régulière de votre tension artérielle (auto-mesure ou mesure par un professionnel de santé).	Contacter votre médecin si la tension augmente.
Palpitations cardiaques		Appeler votre médecin.
Insomnie, anxiété, dépression	Comportements éventuellement à adapter. Techniques complémentaires possibles.	Parlez en à votre médecin.
Œdèmes des jambes	Surveillance de l'apparition d'oedèmes ou/et prise de poids rapide.	Contacter votre médecin.

Version finalisée octobre 2023
Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI).
Copyright ONCO AURA 2023. Tous droits réservés