FICHE D'INFORMATION THÉRAPEUTIQUE

Ribociclib KISQALI ®

PATIENTS

A QUOI SERT ET COMMENT SE PRESENTE VOTRE MEDICAMENT ?

- **Indication** : Traitement de patientes adultes atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique.
- Boite de 21, 42 ou 63 comprimés à 200mg.
- Ce médicament est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

- Laisser les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.

POINTS DE VIGILANCE

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 21 jours après l'arrêt. Une double contraception efficace est recommandée.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement et jusqu'à 21 jours après l'arrêt.
- Certains produits de phytothérapie ou aliments peuvent interagir avec ce médicament, tels que le millepertuis et le pamplemousse (jus et fruit).

COMMENT PRENDRE CE MÉDICAMENT ?

- Le Ribociclib se prend une fois par jour pendant 21 jours consécutifs suivis d'une interruption pendant 7 jours, à la même heure, de préférence le matin.

- Les comprimés doivent être avalés en entier (ne doivent pas être écrasés, ni mâchés) avec un verre d'eau, en dehors ou pendant un repas.
- Lavez-vous les mains avant et après chaque manipulation.
- Si vous avez oublié de prendre votre médicament, prenez la dose habituellement prescrite (sans doubler celle-ci) le jour suivant. Noter l'oubli dans le carnet de suivi.
- En cas de vomissements, ne reprenez pas de dose supplémentaire et ne doublez pas la suivante. Notez l'incident sur le carnet de suivi.
- La dose prescrite vous est strictement personnelle. L'efficacité du traitement est conditionnée par le fait que vous preniez votre traitement tel qu'il vous a été prescrit, et sur toute sa durée.

GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez - vous en rapport avec votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra vous demander de diminuer la dose ou d'arrêter votre traitement, momentanément ou définitivement.

Effets indésirables qui peuvent survenir :	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être réalisé régulièrement. Les résultats doivent être communiqués à votre médecin. Limiter le contact avec les personnes malades, lavez vous les mains fréquemment, désinfecter vos plaies.	- En présence de signes infectieux (température > 38° C, frissons, toux, brûlures urinaires), contacter le médecin.
Ulcération de la bouche	Maintenir une bonne hygiène buccale, utiliser une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas. Utiliser les bains de bouche prescrits.	Contacter votre médecin si besoin, notamment si difficulté pour s'alimenter.
Diarrhées	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons…).	Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Troubles hépatiques	Eviter les aliments gras, frits, trop sucrés et l'alcool. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits.	Contacter votre médecin en cas de modification du bilan sanguin.
Troubles cutanés	Utiliser un savon doux et un agent hydratant. Eviter l'exposition au soleil.	Signaler au médecin la survenue de cet effet sans tarder.
Fatigue, faiblesse Insomnies	Repos fréquent. Pratiquez des exercices modérés (marche).	Prudence si vous devez conduire. Contacter votre médecin si les symptômes persistent.
Céphalées		Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1gramme par prise, maximum 4 fois par jour).
Palpitations	Surveillance régulière de votre cœur (ECG, bilans sanguins: potassium, calcium…), mesure régulière de votre tension artérielle.	Contacter votre médecin en cas d'apparition des signes.

Version finalisée octobre 2023
Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI).
Copyright ONCO AURA 2023. Tous droits réservés