

Idélalisib ZYDELIG®



PATIENTS

A QUOI SERT ET COMMENT SE PRESENTE VOTRE MEDICAMENT ?

- Indications :** Traitement de patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome folliculaire.
- Flacon de 60 comprimés à 100 mg ou 150 mg.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

- Laisser les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.

POINTS DE VIGILANCE

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt.
- Risque de diminution de l'efficacité des contraceptifs hormonaux : employer en plus une méthode dite de barrière.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Certains produits de phytothérapie ou aliments peuvent interagir avec ce médicament, tels que le millepertuis et le pamplemousse (jus et fruit).

GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez - vous en rapport avec votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra vous demander de diminuer la dose ou d'arrêter votre traitement, momentanément ou définitivement.

Effets indésirables qui peuvent survenir :	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin	Un bilan sanguin doit être réalisé avant le début du traitement, puis deux fois par mois pendant 6 mois. Les résultats doivent être communiqués à votre médecin.	En présence de signes infectieux (température > 38° C, frissons, toux, brûlures urinaires), contacter le médecin.
Toux, essoufflement, difficultés à respirer		Contactez votre médecin.
Troubles hépatiques	Eviter les aliments gras, frits, trop sucrés et l'alcool. Faire pratiquer les bilans sanguins prescrits.	Contactez votre médecin en cas de modification du bilan sanguin.
Troubles cutanés	Utiliser un savon doux et un agent hydratant. Eviter l'exposition au soleil.	Signaler au médecin la survenue de cet effet sans tarder.
Diarrhée	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).	Prendre les anti-diarrhéiques prescrits si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.

