

# Osimertinib TAGRISSO®



PROFESSIONNELS

## MECANISME D'ACTION ET INDICATIONS

- L'Osimertinib est une thérapie ciblée, inhibiteur de tyrosines kinases EGFR.
- **Indications** : Traitement de patients adultes atteints de cancers bronchiques non à petites cellules :
  - Localement avancé ou métastatique EGFR muté en 1<sup>ère</sup> ligne;
  - Localement avancé ou métastatique avec mutation EGFR T790M;
  - De stade IB-IIIa avec mutations activatrices EGFR, après résection tumorale.

## MODALITES DE PRISE ET CONSERVATION

- **Modalités de prise** : le comprimé doit être avalé en entier (ni écrasé, ni mâché) avec un verre d'eau au cours ou en dehors des repas, à la même heure.
- Ne pas déconditionner, ni stocker dans un pilulier.
- **En cas d'oubli d'une prise** :
  - Si oubli < 12 heures : prendre la dose.
  - Si oubli ≥ 12 heures : ne pas prendre la dose oubliée et reprendre le traitement aux horaires habituels.
- **En cas de vomissements**, ne pas reprendre de dose supplémentaire et ne pas doubler la dose suivante.

## POSOLOGIE, CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

- **Posologie usuelle** : 80mg par jour en une prise, en continu.
- **Dosages disponibles** : comprimés à 40 mg et 80mg.
- L'Osimertinib est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier en cancérologie.
- Dispensation dans les pharmacies de ville.

## POINTS DE VIGILANCE

- Les femmes et les hommes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant le traitement, et jusqu'à 2 mois après l'arrêt du traitement chez les femmes et 4 mois chez les hommes.
- Risque de diminution de l'efficacité de la pilule contraceptive : employer en plus une méthode dite de barrière.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement (risque potentiel pour le nourrisson).
- Ce médicament est métabolisé par le CYP 3A4.
- Ce médicament est un inhibiteur du CYP 3A4, de la P-gp, et de la BCRP.

## GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- Si les effets indésirables sont difficilement contrôlés, prendre contact avec le médecin prescripteur, qui pourra adapter le traitement anticancéreux.

EI TRÈS FRÉQUENTS	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
<b>Neutropénie, thrombopénie, anémie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hygiène générale</li> <li>• NFP avant chaque cure.</li> <li>• Surveillance des signes évocateurs d'infection et de saignements.</li> </ul>	Alerter le médecin prescripteur en cas de température > 38,5°C qui décidera de la conduite à tenir.
<b>Diarrhée</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits.</li> <li>• Eviter le café, le lait, l'alcool.</li> <li>• Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...).</li> </ul>	Réévaluer le traitement anti-diarrhéique.
<b>Stomatite</b>	Rappel au patient d'avoir une bonne hygiène buccale, utilisation d'une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas et qu'il évite les aliments acides, épicés et irritants.	Prescription de bains de bouche au bicarbonate, sans alcool. Alerter le médecin si présence d'ulcérations ou d'une bouche douloureuse.
<b>Eruption cutanée, sécheresse cutanée, péryonix</b>	Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur ainsi que toute irritation des mains. Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émolliente.	Alerter le médecin prescripteur qui décidera ou non de la modification du traitement.
<b>Fatigue</b>	Conserver une activité physique modérée.	Prudence en cas de conduite de véhicule.
PEU FREQUENTS		
<b>Allongement intervalle QT/ FA/tachycardies sinusales</b>	ECG et dosage électrolytes avant début du traitement et régulièrement.	
<b>Pneumopathie interstitielle diffuse ou pneumopathie inflammatoire, dyspnée, toux</b>		Alerter immédiatement le médecin prescripteur.

Pour plus d'informations, consulter le RCP du médicament

Version validée octobre 2023  
Reproduction interdite (art. L122-6, 335-2 et 335-3 CPI).  
Copyright ONCO AURA 2023. Tous droits réservés



Thérapeutiques anticancéreuses  
ressources-aura.fr