

Osimertinib TAGRISSO®



PATIENTS

A QUOI SERT ET COMMENT SE PRESENTE VOTRE MÉDICAMENT ?

- **Indication** : Traitement de patients adultes atteints de cancers bronchiques non à petites cellules.
- Boîte de 30 comprimés à 80mg ou 40 mg.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

- Laissez le comprimé dans son emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.

POINTS DE VIGILANCE

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 2 mois chez les femmes et 4 mois chez les hommes après l'arrêt.
- Risque de diminution de l'efficacité des contraceptifs hormonaux : employer en plus une méthode dite de barrière.
- Ne pas prendre ce médicament au cours de l'allaitement.
- Certains produits de phytothérapie ou aliments peuvent interagir avec ce médicament, tels que le millepertuis et le pamplemousse (jus et fruit).

GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez - vous en rapport avec votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra vous demander de diminuer la dose ou d'arrêter votre traitement, momentanément ou définitivement.

TRÈS FRÉQUENTS	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
Fatigue	Repos fréquent. Pratiquez des exercices modérés (marche).	
Saignements inhabituels Ecchymoses	Eviter les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...), l'aspirine.	Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (ex : nez, urine...).
Fièvre, frissons	Reposez vous souvent. Limiter les contacts avec les personnes malades. Lavez vous les mains fréquemment. Désinfecter vos plaies.	Contactez votre médecin en cas de température > 38,5°C.
Ulcération de la bouche	Maintenir une bonne hygiène buccale, utiliser une brosse à dents souple et un dentifrice doux (sans menthol) après chaque repas. Utiliser les bains de bouche prescrits.	Contactez votre médecin si besoin, notamment si difficulté pour s'alimenter.
Diarrhées	Eviter les aliments trop chauds, épicés et frits. Eviter le café, le lait, l'alcool. Boire beaucoup d'eau (thé, tisanes, bouillons...)	Prendre des anti-diarrhéiques si 1 à 2 selles liquides par jour. Alerter le médecin si diarrhée importante : plus de 2 à 4 selles par jour.
Eruption cutanée, sécheresse cutanée, inflammation autour de l'ongle	Eviter l'exposition au soleil et utilisation d'une protection solaire adaptée. Utiliser un savon doux et une crème émolliente.	Contactez votre médecin si besoin.
PEU FREQUENTS		
Toux, dyspnée		Contactez votre médecin

