

Avélumab (BAVENCIO®)

Indications : Traitement du cancer du rein, cancer urothélial, carcinome à cellules de Merkel

D'autres indications peuvent être validées en RCP

Protocole :

- Posologie : 800 mg toutes les 2 semaines

les posologies et rythmes d'administration dépendent du protocole prescrit.

- Prémédication : antihistaminique et de paracétamol avant les 4 premières perfusions de ce médicament. Si la quatrième perfusion a pu être réalisée sans que survienne de réaction liée à la perfusion, l'administration de la prémédication avant les doses suivantes sera laissée à l'appréciation du médecin.

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable

Présentation de la chimiothérapie : solution limpide, incolore à légèrement jaune

- Solvant : NaCl 0.9 %

Conservation et stabilité : données des RCP (consultés le 15/05/2024)

- **Dilution dans NaCl 0.9 %** : 96 heures entre 2°C et 8°C , 72 heures à une température ≤ 25°C depuis le moment de la préparation.

Modalités d'administration : par voie intraveineuse, perfusion de 60 minutes ; en utilisant un filtre de 0,2µm à faible liaison protéique

Rinçage de la ligne de perfusion après l'administration avec du NaCl 0,9%

Surveillance et effets indésirables très fréquents :

- Toxicité pulmonaire (essoufflement, toux)
- Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, constipation
- Surveillance du ionogramme complet, du bilan hépatique, rénale et thyroïdien
- Troubles endocriniens (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète)

Coût moyenne d'une cure : à compléter