

Durvalumab (IMFINZI®)

Indications : Traitement du cancer bronchique non à petites cellules, cancer bronchique à petites cellules, cancer des voies biliaires, carcinome hépatocellulaire

D'autres indications peuvent être validées en RCP

Protocole :

- Posologie : 10 mg/kg toutes les 2 semaines ou 1 500 mg toutes les 4 semaines

| | J1 | ... | J15 | ... | J22 | ... | J29 |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durvalumab 10 mg/kg | | | | | | | |
| Durvalumab 1 500 mg | | | | | | | |

les posologies et rythmes d'administration dépendent du protocole prescrit.

- Prémédication : aucune

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable

Présentation de la chimiothérapie : solution claire à opalescente, incolore à jaune pâle

- Solvant : NaCl 0.9 % ou du glucose 5%

Conservation et stabilité : données des RCP (consultés le 15/05/2024)

30 jours entre 2°C et 8°C , 24 heures à une température ≤ 25°C depuis le moment de la préparation.

Modalités d'administration : par voie intraveineuse, 60 minutes, utilisation filtre 0.2µm à faible liaison protéique

Rinçage de la ligne de perfusion après l'administration avec du NaCl 0,9% ou G5%

Surveillance et effets indésirables très fréquents :

- Surveillance de l'ionogramme complet, du bilan hépatique, rénale et thyroïdien
- Toxicité pulmonaire (essoufflement, toux) , infections respiratoires
- Troubles endocriniens (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète)
- Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, constipation
- Eruption cutanée, prurit
- Affections musculo-squelettique : arthralgie, douleurs musculaires

Cout moyenne d'une cure : à compléter