

Vinorelbine (NAVELBINE®)

Indications : cancer du sein, cancer du poumon non à petites cellules

Protocole :

- Posologie : 15 à 30 mg/m² à J1 et J8 toutes les 3 semaines
- Jour d'administration du traitement en HAD : J8
- **Prémédication : Selon prescription médicale si nécessaire**

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable

Présentation de la chimiothérapie : solution limpide incolore à jaune clair

Solvant : NaCl 0.9 % ou Glucose 5%

Conservation et stabilité : 8 jours à température ambiante ≤ 25°C ou au réfrigérateur (+2°C à +8°C) à l'abri de la lumière

Modalités d'administration : Perfusion de 20 à 30 min

Rinçage de la ligne de perfusion après l'administration avec du NaCl 0,9%

Risque important de nécrose cutanée en cas d'extravasation. En cas d'extravasation, appeler immédiatement l'HAD et appliquer la procédure.

Effets indésirables graves

Prévenez immédiatement un médecin ou un/une infirmier/ère si vous remarquez un des effets indésirables suivants :

- Neutropénie (J7 à J10, réversible)
- Neurotoxicité : paresthésies, diminution des réflexes ostéotendineux
- Nausées, vomissements : prémédication non systématique, à adapter selon les patients
- Constipation

Coût moyenne d'une cure : Tarif inclus dans le GHS