

## Trastuzumab sous-cutanée (HERCEPTIN®)

### CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

#### Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique <b>sans vinyle</b> et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids ( <i>si perte de poids <math>\geq 10\%</math> contacter le prescripteur</i> ), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le patient ou réaliser la prémédication prescrite	<input type="checkbox"/>
6- Préparation à l'administration	Désinfecter la zone d'administration	<input type="checkbox"/>

#### Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Sous cutanée : cuisse Alterner les sites d'injection Au moins 2.5 cm d'écart avec un ancien site d'injection <b>Jamais à des endroits où la peau est rouge, avec un bleu, sensible ou dure.</b>	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	Injection sous-cutanée pendant 2 à 5 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Surveiller le patient pendant au moins 15 min après la fin de la perfusion de trastuzumab	<input type="checkbox"/>

#### Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Hypersensibilité, réaction allergique</li> <li>✓ La fonction cardiaque des sujets traités par trastuzumab doit être évaluée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'initiation du traitement,</li> <li>• puis <b>tous les 3 mois au cours</b> du traitement,</li> <li>• <b>tous les 6 mois après l'arrêt</b> du traitement, <b>jusqu'à 24 mois</b> après la dernière administration de trastuzumab.</li> </ul> </li> </ul> <p>La surveillance repose sur la <b>mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) par un échocardiogramme ou une scintigraphie cardiaque (MUGA).</b></p>	<input type="checkbox"/>

2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	<input type="checkbox"/>
4- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations