

Pertuzumab (PERJETA[®])

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'Identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique sans vinyle et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids (<i>si perte de poids ≥ 10% contacter le prescripteur</i>), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Préparation à l'administration	Préparer la ligne de perfusion. Vérifier la présence d'un reflux veineux de la voie d'abord utilisée.	<input type="checkbox"/>

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Perfusion intraveineuse	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	Dose de charge : 60 minutes (pas d'injection en HAD) Dose d'entretien : 30 à 60 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Surveillance durant votre injection et pendant 30 à 60 minutes après la fin de celle-ci. En cas de réactions en cours de perfusion : la vitesse de perfusion doit être diminuée ou l'administration doit être interrompue si le patient développe une réaction à la perfusion	<input type="checkbox"/>

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	30 à 60 minutes après la fin de la perfusion	<input type="checkbox"/>
2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	<input type="checkbox"/>
4- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations