

# Niraparib ZEJULA®



PATIENTS

## A QUOI SERT ET COMMENT SE PRESENTE VOTRE MEDICAMENT ?

- **Indications** : Traitement de patientes adultes atteintes d'un cancer de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallopes ou péritonéal primitif.
- Boîte de 56 comprimés ou 84 comprimés de 100mg.
- Ce médicament vous est prescrit par un médecin spécialiste hospitalier. Il est disponible exclusivement dans les pharmacies de ville.
- N'oubliez pas de donner la liste complète des médicaments que vous prenez, y compris ceux obtenus sans ordonnance, à votre médecin et votre pharmacien.

## COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT ?

- Laissez les comprimés dans leur emballage initial jusqu'à la prise.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conservation à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière.

## POINTS DE VIGILANCE

- Une contraception efficace doit être utilisée pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt du traitement.
- L'allaitement doit être interrompu au cours du traitement et jusqu'à 1 mois après l'arrêt.

## GESTION DES EFFETS INDÉSIRABLES (EI)

- Ne pas modifier le traitement anticancéreux sans l'avis du médecin prescripteur.
- En cas d'apparition d'effets indésirables gênants, mettez - vous en rapport avec votre médecin prescripteur. Celui-ci pourra vous demander de diminuer la dose ou d'arrêter votre traitement, momentanément ou définitivement.

Effets indésirables qui peuvent survenir:	PREVENTION	CE QUE VOUS DEVRIEZ FAIRE
<b>Diminution des plaquettes de votre bilan sanguin</b>	Un bilan sanguin doit être réalisé une fois par semaine le 1er mois puis une fois par mois. Eviter l'aspirine, les anti-inflammatoires (ibuprofène, kétoprofène...).	Contactez rapidement votre médecin si saignements inhabituels (nez, urine...).
<b>Diminution des globules blancs de votre bilan sanguin</b>  <b>Fièvre, frissons</b>	Les résultats du bilan sanguin doivent être communiqués à votre médecin. Reposez vous souvent. Limiter les contacts avec les personnes malades. Lavez vous les mains fréquemment. Désinfecter vos plaies.	Prenez votre température avant chaque prise. En présence de signes infectieux (température > 38°C, frissons, toux, brûlures urinaires), contactez le médecin.
<b>Eruption cutanée, sécheresse cutanée, photosensibilité</b>	Utiliser un savon doux et appliquer une crème hydratante et/ou émolliente. Eviter l'exposition au soleil et à la chaleur.	
<b>Dorsalgie, arthralgie, myalgie</b>  <b>Céphalées, sensations vertigineuses</b>	Repos et exercices modérés (marche). Ayez une bonne hygiène de vie. Ne pas boire d'alcool.	Prendre du paracétamol si nécessaire (500mg à 1g/prise ; maximum de 4 prises par jour) Prudence en cas de conduite de véhicule. Contactez votre médecin si les symptômes persistent.
<b>Hypertension artérielle.</b>	Effectuer une mesure régulière de votre tension artérielle (auto-mesure ou mesure par un professionnel de santé).	Contactez votre médecin si la tension augmente.
<b>Palpitations cardiaques</b>		Appeler votre médecin.
<b>Insomnie, anxiété, dépression</b>	Comportements éventuellement à adapter. Techniques complémentaires possibles.	Parlez en à votre médecin.
<b>Œdèmes des jambes</b>	Surveillance de l'apparition d'œdèmes ou/et prise de poids rapide.	Contactez votre médecin.

