

## Cytarabine sous-cutanée (ARACYTINE®)

**Indications :** Traitement des patients adultes atteints de leucémie aigüe myéloïde, ou de transformation aigüe de leucémie myéloïde chronique et de myélodysplasie.

*D'autres indications peuvent être validées en RCP*

**Protocole :**

- Posologie : 20mg/m<sup>2</sup>/jour, en 1 ou 2 administrations par jour pendant 5 à 10 jours

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
Cytarabine SC 20mg/m <sup>2</sup>										

*D'autres rythmes d'administration existent et dépendent du protocole prescrit.*

- **Prémédication : Selon prescription médicale si nécessaire**

**Forme pharmaceutique commerciale :** solution injectable ou poudre à reconstituer

**Présentation de la chimiothérapie :** solution limpide et incolore, en seringue.

**Conservation et stabilité :** données des RCP (consultés le XX/XX/XXXX)

Dénomination	Laboratoire	Stabilité
ARACYTINE 100mg, poudre et solvant	PFIZER	24h à température inférieure à 25°C
CYTARABINE 100mg/mL, solution injectable	ACCORD	24h à température inférieure à 25°C 72h entre 2°C et 8°C
CYTARABINE 20mg/mL, solution injectable	ACCORD	8 jours à température inférieure à 25°C pour des concentrations à 0,04mg/mL, 1mg/mL, et 4mg/mL
CYTARABINE 20mg/mL, solution injectable	SANDOZ	28 jours entre 2°C et 8°C ou entre 20°C et 25°C pour des concentrations à 0,1mg/mL, 20mg/mL (dilution avec du NaCl 0,9%) 28 jours entre 2°C et 8°C ou 14 jours entre 20°C et 25°C pour une concentration à 0,1mg/mL (dilution avec du Glucose 5%) 28 jours entre 2°C et 8°C ou entre 20°C et 25°C pour une concentration à 20mg/mL (dilution dans du Glucose 5%)

**Modalités d'administration :** injection sous-cutanée dans la cuisse ou l'abdomen

- Alternier les sites d'injection
- Introduire l'aiguille avec un angle de 45 à 90°

**Surveillance et effets indésirables très fréquents :**

- Toxicités hématologiques : neutropénie, thrombopénie, anémie, leucopénie.
- Infection pulmonaire, sepsis.
- Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, constipation.
- Toxicité hépatique
- Alopécie, rash
- Syndrome cytarabine : fièvre, myalgies, douleurs osseuses accompagnées dans certains cas par des douleurs thoraciques, rashes maculopapuleux, conjonctivite et sensation de malaise général

**Coût moyenne d'une cure :** Tarif inclus dans le GHS