

Daratumumab sous-cutanée (DARZALEX®)

Indications : Traitement des patients adultes atteints de myélome multiple

D'autres indications peuvent être validées en RCP

Protocole :

- Posologie : 1800mg, le rythme d'administration dépend du protocole prescrit

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Daratumumab 1800mg SC | J1 | J2 | ... | J8 | J9 | ... | J15 | J16 | ... | J22 | J23 | ... | J28 | J29 |
| Daratumumab 1800mg SC | | | | | | | | | | | | | | |
| Daratumumab 1800mg SC | | | | | | | | | | | | | | |
| Daratumumab 1800mg SC | | | | | | | | | | | | | | |

- Prémédication : corticoïde, antipyrétique, et antihistaminique selon la prescription médicale
- Post-médication : corticoïde selon la prescription médicale

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable prête à l'emploi.

Présentation de la chimiothérapie : solution de 15mL, limpide à opalescente, incolore à jaune, en seringue.

Conservation et stabilité : Données du RCP (consulté le XX/XX/XXXX)

- 24h entre 2°C et 8°C suivi de 15h entre 15°C et 25°C.

Modalités d'administration : injection sous-cutanée dans l'abdomen à environ 7,5 cm à droite ou à gauche du nombril

- Alternier les sites d'injection.
- Introduire l'aiguille avec un angle de 45° à 90°.
- Ne doit jamais être injecté dans des zones où la peau est rouge, contusionnée, sensible, indurée, ou dans les zones portant des cicatrices.
- Arrêter ou ralentir le débit si le patient ressent de la douleur. Si la douleur n'est pas atténuée en ralentissant l'injection, un deuxième site d'injection peut être choisi de l'autre côté de l'abdomen pour administrer le reste de la dose.

Surveillance et effets indésirables très fréquents :

- Infections et affections respiratoires : IVRS, pneumopathie, bronchite, toux, dyspnée.
- Toxicités hématologiques : neutropénie, thrombopénie, anémie, leucopénie, lymphopénie.
- Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhées, constipation.
- Affections musculo-squelettique : dorsalgies, spasmes musculaires, arthralgie.
- Rash cutanée et réactions aux points d'injection.
- Neuropathie périphérique sensitive, céphalée.
- Fièvre, asthénie, Insomnie, œdème périphérique, diminution de l'appétit.

A consulter : Bonne pratique ONCOAURA [MODALITÉS D'ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTÉRALE DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX D'IMMUNOTHÉRAPIE ET DE THÉRAPIES CIBLÉES](#)

Coût moyenne d'une cure : Tarif de responsabilité de 4368€ HT (Publication le 02/03/2021)