

Bortezomib (VELCADE®)

Indications : Traitement des patients adultes atteints de myélome multiple

D'autres indications peuvent être validées en RCP

Protocole :

- Posologie : 1.3mg/m²

	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11
Bortezomib 1,3mg/m ²											

Reprise
J21

	J1	J2	...	J7	J8	J9	...	J14	J15	J16	...	J21	J22
Bortezomib 1,3mg/m ²													

Reprise
J28

D'autres rythmes d'administration existent et dépendent du protocole prescrit.

- **Prémédication :** Selon prescription médicale si nécessaire

Forme pharmaceutique commerciale : solution injectable (doit être diluée avec du NaCl 0,9% à une concentration de 1mg/mL en cas d'injection IV) ou poudre à reconstituer

Présentation de la chimiothérapie : solution limpide et incolore en seringue

Conservation et stabilité : Données des RCP (consultés le XX/XX/XXXX)

Dénomination	Laboratoire	Stabilité
BORTEZOMIB 2,5mg/mL, solution injectable	ACCORD	24h entre 20°C et 25°C à une concentration de 1mg/mL.
	EG, et EVER PHARMA	28 jours entre 2°C et 8°C à l'abri de la lumière, 7 jours à 25°C à l'abri de la lumière, 24h à 25°C en conditions normales d'éclairages intérieur en seringue en polypropylène.
BORTEZOMIB 3,5mg, poudre pour solution injectable	ARROW, et BAXTER	8h à 25°C. Ne pas mettre au réfrigérateur.
	SUN, et JANSEEN (VELCADE®)	8h à 25°C
	REDDY PHARMA	8h à 25°C et 15jours entre 2°C et 8°C
	STRAGEN, VIATRIS, et ZENTIVA	8 jours à 25°C et 15 jours entre 2°C et 8°C à l'abri de la lumière
	TEVA	24h à 25°C

Modalités d'administration : injection sous-cutanée dans les cuisses ou l'abdomen

- Alternier les sites d'injection.
- Introduire l'aiguille avec un angle de 45 à 90°.
- En cas de réaction locale au point d'injection, soit une solution moins concentrée (1mg/mL) peut être administrée par voie sous-cutanée soit un passage à une injection intraveineuse est recommandé.

Surveillance et effets indésirables très fréquents :

- Toxicité hématologique : Anémie, Neutropénie, Thrombopénie
- Toxicité digestive : nausées, vomissements, diarrhées, constipation

Cout moyenne d'une cure : Tarif inclus dans le GHS

- Réaction cutanée aux sites d'injection
- Douleur neuropathique et neuropathie périphérique
- Douleur musculo-squelettique
- Fièvre, asthénie, diminution de l'appétit.

Coût moyenne d'une cure : Tarif inclus dans le GHS