

Daratumumab sous-cutanée (DARZALEX®)

CHECK-LIST : Sécurisation de l'administration de chimiothérapie en HAD

A consulter : Bonne pratique ONCOAURA [MODALITÉS D'ADMINISTRATION PAR VOIE PARENTÉRALE DES MÉDICAMENTS ANTICANCÉREUX D'IMMUNOTHÉRAPIE ET DE THÉRAPIES CIBLÉES](#)

Avant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Vérification de l'identité du patient	Demander au patient de décliner son identité : nom, prénom, date de naissance	<input type="checkbox"/>
2- Hygiène et EPI	Hygiène des mains Port de gant d'examen à usage unique sans vinyle et d'une blouse	<input type="checkbox"/>
3- Contrôle de la chimiothérapie	Intégrité du produit Date de péremption Modalité de conservation Concordance avec la prescription	<input type="checkbox"/>
4- Prise de constantes	Poids (<i>si perte de poids $\geq 10\%$ contacter le prescripteur</i>), TA, FC, Température	<input type="checkbox"/>
5- Prémédication	Vérifier la prise de la prémédication par le patient ou réaliser la prémédication prescrite	<input type="checkbox"/>
6- Préparation à l'administration	Mettre la seringue à température ambiante Utiliser une aiguille de 25G et ne pas purger l'aiguille avant administration Désinfecter la zone d'administration	<input type="checkbox"/>

Pendant l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Voie d'administration	Injection sous-cutanée : abdomen à 7,5cm à gauche ou à droite du nombril. Alterner les sites d'injections. Ne doit jamais être injecté dans des zones où la peau est rouge, contusionnée, sensible, indurée, ou dans les zones portant des cicatrices.	<input type="checkbox"/>
2- Durée d'administration	3 à 5 minutes	<input type="checkbox"/>
3- Surveillance particulière	Arrêter ou ralentir le débit si le patient ressent de la douleur. Si la douleur n'est pas atténuée en ralentissant l'injection, un deuxième site d'injection peut être choisi de l'autre côté de l'abdomen pour administrer le reste de la dose.	<input type="checkbox"/>

Après l'administration de la chimiothérapie

Etape	Descriptif	Réalisation
1- Surveillance immédiate	Réaction cutanée au point d'administration	<input type="checkbox"/>
2- Traçabilité de l'administration	Heure d'administration, quantité administrée	<input type="checkbox"/>
3- Post-médication	Corticoïde selon la prescription médicale	<input type="checkbox"/>

4- Surveillance durant l'intercure	Education du patient aux survenues des EI fréquents / Appel téléphonique à Jx ?	<input type="checkbox"/>
5- Elimination des déchets	Filière d'élimination des dispositifs souillés par de la chimiothérapie	<input type="checkbox"/>

Certaines étapes peuvent être réalisées par un autre professionnel de santé en fonction des organisations