

## **Avélumab (BAVENCIO®)**

**Indications** : Traitement du cancer du rein, cancer urothélial, carcinome à cellules de Merkel

*D'autres indications peuvent être validées en RCP*

**Protocole** :

- Posologie : 800 mg toutes les 2 semaines

*les posologies et rythmes d'administration dépendent du protocole prescrit.*

- Prémédication : antihistaminique et de paracétamol avant les 4 premières perfusions de ce médicament. Si la quatrième perfusion a pu être réalisée sans que survienne de réaction liée à la perfusion, l'administration de la prémédication avant les doses suivantes sera laissée à l'appréciation du médecin.

**Forme pharmaceutique commerciale** : solution injectable

**Présentation de la chimiothérapie** : solution limpide, incolore à légèrement jaune

- Solvant : NaCl 0.9 %

**Conservation et stabilité** : données des RCP (consultés le 15/05/2024)

- **Dilution dans NaCl 0.9 %** : 96 heures entre 2°C et 8°C , 72 heures à une température ≤ 25°C depuis le moment de la préparation.

**Modalités d'administration** : par voie intraveineuse, perfusion de 60 minutes ; en utilisant un filtre de 0,2µm à faible liaison protéique

Rinçage de la ligne de perfusion après l'administration avec du NaCl 0,9%

**Surveillance et effets indésirables très fréquents** :

- Réaction liée à la perfusion
- Toxicité pulmonaire (essoufflement, toux)
- Nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, constipation
- Surveillance du ionogramme complet, du bilan hépatique, rénale et thyroïdien
- Troubles endocriniens (hypothyroïdie, hyperthyroïdie, diabète)